

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

1. Profil penggunaan obat-obat pada pasien kardiovaskular di RSUD Kota Yogyakarta periode tahun 2015-2017 berdasarkan DU90% yaitu amlodipin, kandesartan, furosemid, irbesartan, dan digoksin. Trimetazidin dan nifedipin digunakan tahun 2015, valsartan digunakan tahun 2016 dan ramipril tahun 2017, telmisartan digunakan tahun 2015 dan 2016, dan bisoprolol digunakan tahun 2016 dan 2017.
2. Terdapat perubahan kuantitas dari penggunaan obat-obat kardiovaskular pasien rawat jalan di RSUD Kota Yogyakarta pada tahun 2015-2017, obat tersebut yaitu amlodipin, kandesartan, dan irbesartan. Amlodipin obat dengan penggunaan tertinggi dan mengalami peningkatan setiap tahunnya. Pada tahun 2015 penggunaan amlodipin sebesar 25,69%, pada tahun 2016 sebesar 26,45% dan pada tahun 2017 sebesar 26,90% berdasarkan kuantitas total DDD dan profil DU90%.

5.2. Saran

1. Saran untuk RSUD Kota Yogyakarta
Melakukan evaluasi terkait seleksi dan pengadaan obat trimetazidin, nifedipin, valsartan, ramipril. Mencoba evaluasi menggunakan metode ATC/DDD dan DU90% secara berkala.
2. Saran untuk peneliti selanjutnya
Diharapkan peneliti selanjutnya untuk melakukan penelitian lebih spesifik terkait penyakit kardiovaskular menggunakan metode tersebut.