

Lampiran 1 Surat keterangan *ethical clearance*.

MEDICAL AND HEALTH RESEARCH ETHICS COMMITTEE (MHREC)
 FACULTY OF MEDICINE, PUBLIC HEALTH AND NURSING
 UNIVERSITAS GADJAH MADA – DR. SARDJITO GENERAL HOSPITAL



ETHICS COMMITTEE APPROVAL

Ref. No. : KE/FK/0556 /EC/2019

Title of the Research Protocol : Evaluasi Penggunaan Obat Intravena *Vesicant* terhadap Kejadian *Phlebitis* di *Pediatricintensive Care Unit* (PICU) Rumah Sakit Sardjito Yogyakarta

Document(s) Approved and version : Study Protocol version 01 2019

Principle Investigator : Desy Silvia

Participating Investigator(s) : 1. Suci Hanifah, M.Si., Ph.D., Apt.
2. Ninisita Sri Hadi, M.Sc., Apt.

Date of Approval : **23 MAY 2019**
(Valid for one year beginning from the date of approval)


Institution(s)/place(s) of research : Rumah Sakit Sardjito Yogyakarta


The Medical and Health Research Ethics Committee (MHREC) states that the document above meets the ethical principle outlined in the International and National Guidelines on ethical standards and procedures for researches with human beings.

The Medical and Health Research Ethics Committee (MHREC) has the right to monitor the research activities at any time.

The investigator(s) is/are obliged to submit:

- Progress report as a continuing review (state its due time)
- Report of any serious adverse events (SAE)
- Final report upon the completion of the study


 Prof. dr. Tri Wibawa, Ph.D., Sp.MK(K).
 Panel's chairperson


 dr. Yana Supriatna, Sp.Rad(K), Ph.D.
 Panel's secretary

Lampiran 2 Data pasien anak di Rumah Sakit Sardjito Yogyakarta.

No	Usia / BB	JK	Diagnosa	Satatus keluar	LOS	Nama obat dan Nama Cairan IV	Jumlah Obat dan Cairan / Hari										Rata rata Penggunaan Obat Rawat Inap	Rata rata Penggunaan Obat 1 Waktu	Jalur IV	Kejadian <i>Phlebitis</i> ya/tidak	
							1	2	3	4	5	6	7	8	9	10					
1	3th/1 3,5kg	L	Sepsis, gizi kurang, anemia, hematiroid, diare, ulkus gater	Membaik	5 hari	Cefotaxime 700mg/6j	√	√	√	√	√							4	1	CVC	Tidak
						Ranitidin 13,5mg/12j	√	√	√	√	√										
						Paracetamol 150mg/6j	√	√	√	√	√										
						Sukralfat 250mg/8j	√	√			√										
						Furosemid 0,5mg/kg	√														
						Vankomisin 500mg/6j			√												
						Rf 45ml/j	X														
						Midazolam 1mcq-1,6ml/j	X	X	X												
						Fantamil 1mcq-0,5ml/j			X	X	X										
Dopamin 10mcq-2ml/j	X	X																			
2	2th/1 1,5kg	P	Hipokalemia, hipokalsemia, ulcer, sepsis, diare	Membaik	6 hari	Meropenem 200mg/8j	√	√	√	√	√	√					4,1666	1	CVC	Tidak	
						Metronidazol 100mg/8j	√	√	√												
						Paracetamol 150mg/8j		√	√	√	√	√									
						Omeprazole 10mg/8j	√	√	√	√	√	√									
						Vankomisin 500mg/6j	√	√													
						Zink 20g/24j				√	√	√									
						D10% -37,95ml/j	X	X	X	X											
						Midazolam 2mcq-1,4ml/j	X	X	X	X	X	X									
						Fentamil 1mcq-0,23ml/j	X	X													

No	Usia / BB	JK	Diagnosa	Satatus keluar	LOS	Nama obat dan Nama Cairan IV	Jumlah Obat dan Cairan / Hari										Rata rata Penggunaan Obat Rawat Inap	Rata rata Penggunaan Obat 1 Waktu	Jalur IV	Kejadian Phlebitis ya/tidak
							1	2	3	4	5	6	7	8	9	10				
3	6bln/ 6,9kg	P	Bronkitis, anemia, diare, sepsis, alkalosis	Membaik	10 har												6	1	CVC	Tidak
						Cefriaxone 50mg/12j	√	√			√	√	√	√	√	√				
						Azitromicine 1,5mg/hr	√	√			√	√	√	√	√	√				
						Chloralhidrat 10mg/6j	√	√	√	√	√	√	√	√						
						Paracetamol 10mg/4j	√	√	√	√	√	√	√	√						
						Vankomisin 500mg/6j	√	√	√	√	√									
						Metilprednisolon 1mg	√	√	√	√		√	√	√	√	√				
						Zink 20g/24j		√	√	√		√		√						
						Oralit 20mg/hr		√												
						MP 5mg/8j				√	√									
						Myco2 2xue				√	√	√		√	√	√				
						D51/4 N5 1ml/j	X	X	X											
						Miloz 1.68ml/j	X						X	X						
						Ketamin 1mcq-1ml/j	X				X	X								X
						Fentanil 1mcq-0.14ml/j		X	X	X						X	X			X
						Morfin 1mcq-2ml/j			X	X	X	X								X

No	Usia / BB	JK	Diagnosa	Satatus keluar	LOS	Nama obat dan Nama Cairan IV	Jumlah Obat dan Cairan / Hari										Rata rata Penggunaan Obat Rawat Inap	Rata rata Penggunaan Obat 1 Waktu	Jalur IV	Kejadian <i>Phlebitis</i> ya/tidak		
							1	2	3	4	5	6	7	8	9	10						
4	16th/ 45kg	P	Syok sepsis, TB abdomen, gizi buruk, AKI cedera, hiponatremia , stomatis, sepsis	Membaik	10 har	Cefotaxime 2.25mg/8j	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	2,5	1	CVC	Tidak		
						Rifampisin 150mg/8j	√	√														
						Ethambutol 275mg/8j	√															
						Zink 20g/24j		√	√	√	√	√	√	√	√	√					√	√
						As.Folat 5mg/24j		√	√	√	√	√	√	√	√	√					√	√
						Multivitamin pulv 1x1		√	√	√	√											
						Nacl 3x1g		√		√	√	√	√	√	√	√					√	√
						Sistenol 450mg/x			√	√	√	√	√	√	√	√					√	√
						Vankomisin 500mg/6j						√	√	√	√	√					√	√
						As.Ursodeoksikolat 350mg/12j						√	√									√
						Kalium 500mg/8j								√	√	√					√	√
						Flukonazole 400mg/24j								√	√	√					√	√
						Urdafalk								√	√	√					√	√
						Sukralfat 500mg/6j								√	√	√					√	√
						Rf 55ml/j	X	X	X	X												
						Norepineprine 0,1mcq-1ml/j		X			X	X										X
						NaCl 0,9% -5cc/24j		X	X	X	X											
Ca Glukosa 40cc/j		X	X					X														
Ketamin 1mcq-1ml/j			X	X					X			X										
Dopamin 10mcq-2ml/j			X	X	X							X										

No	Usia / BB	JK	Diagnosa	Satatus keluar	LOS	Nama obat dan Nama Cairan IV	Jumlah Obat dan Cairan / Hari										Rata rata Penggunaan Obat Rawat Inap	Rata rata Penggunaan Obat 1 Waktu	Jalur IV	Kejadian <i>Phlebitis</i> ya/tidak	
							1	2	3	4	5	6	7	8	9	10					
5	2th 5bln/ 9,8kg	P	Abses cerebri, sepsis, anemia	Meninggal	3 hari	Cefotaxime 500mg/6j	√	√	√									3,666	2	CVC	Tidak
						Asetazolamid 100mg/8j	√	√	√												
						Fenobarbital 15mg/12j	√	√	√												
						KCL 200mg/8j		√	√												
						NaCl 0.9%-8ml/j	X	X	X												
6	16th 9bln/ 15kg	P	Biopsi kista,	Membaik	5 hari	Cefotaxime 2g/8j	√	√	√	√	√						4,8	3	CVC	Tidak	
						Metronidazole 350mg/8j	√	√	√	√	√										
						Ranitidin 50mg/12j	√	√	√	√	√										
						Vankomisin 500mg/6j	√														
						Paracetamol 500mg/x	√	√	√	√	√										
						Ondansentron 4mg/12j			√	√	√										
						D5 12,5%-46ml/j	X	X	X	X	X										
Fentanil 1mcq-0.9ml/j			X	X	X																
7	8hr/0 kg	P	Asidosis respiratorik berat, anemia, hipoalbumin, sepsis	Membaik	8 hari	Cefataxime 275 mg/12j	√	√	√	√	√	√	√	√			2,25	2	CVC	Tidak	
						Paracetamol 10mg/6j			√	√	√	√	√	√							
						Nebu NaCl 0.9% 3cc/6j					√	√									
						D5 1/2 NS-1ml/j	X	X	X												
						Fentanil 3mcq-0,3ml/j			X	X											
						Midazolam 1mcq-0,6ml/j			X	X											
						Albumin 25% -20ml/3j		X		X	X										
						Dobutamin 5mcq-1,5ml/j						X	X								

No	Usia / BB	JK	Diagnosa	Satatus keluar	LOS	Nama obat dan Nama Cairan IV	Jumlah Obat dan Cairan / Hari										Rata rata Penggunaan Obat Rawat Inap	Rata rata Penggunaan Obat 1 Waktu	Jalur IV	Kejadian <i>Phlebitis</i> ya/tidak	
							1	2	3	4	5	6	7	8	9	10					
8	12th 10bln /54kg	L	<i>Phlebitis</i> , epilepsi, asidosis, hipokalemia, sepsis	Membaik	10 hari	Ampicillin 1g/6j	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	3,7	1	PVC	Ya
						Metilprednisolon 35g/24j	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√				
						Paracetamol 500mg/Kp	√	√													
						Chloralhidrat 5,4ml/6j	√	√	√	√	√										
						NaCl 0,9% 3x1g		√	√	√	√	√	√	√	√	√	√				
						Azitromicine 500mg/4j											√				
						Dopamin 10mcq-2ml/j	X					X	X	X							
						Midazolam 2mg/kg/hr-3.2ml/j		X	X	X						X	X				
						Morfin 1mcq-1ml/j		X	X							X	X				
Fentanil 1cc/j						X	X			X	X										
9	2th/9 ,8kg	P	Sepsis, asma intermiten, gizi baik, pneumonia	Membaik	3 hari	Vankomisin 500mg/6j	√										3,6666	1	PVC	Tidak	
						Nebu Ventolin /6j		√	√												
						Methylprednisolon 5mg/6j	√														
						Paracetamol 10mg/Kp	√														
						Cefriaxone 50mg/12j	√	√	√												
						Azitromicine 150mg	√	√	√												
						Rf 13,75ml/j	X	X	X												
Fentanil 1cc/j	X	X																			
10	14th/ 43kg	P	Cidera hati	Membaik	10 hari	Cefataxime 25mg/8j	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	6,6	1	CVC	Tidak	
						Ketorolac 0.2mg/8j	√														
						Ondansentron 8mg/12j	√	√													
						Paracetamol 500mg/6j	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√					√
						Furosemid 20mg/Kp	√														
						Metronidazole 650mg/8j		√	√	√	√	√	√	√	√	√					√
						Vankomisin 500mg/6j		√	√		√	√	√		√						

البحر الاستاذية

No	Usia / BB	JK	Diagnosa	Satatus keluar	LOS	Nama obat dan Nama Cairan IV	Jumlah Obat dan Cairan / Hari										Rata rata Penggunaan Obat Rawat Inap	Rata rata Penggunaan Obat 1 Waktu	Jalur IV	Kejadian Phlebitis ya/tidak				
							1	2	3	4	5	6	7	8	9	10								
						Sucralfat500mg/6j		√	√	√	√	√	√	√										
						Zink 20g/24j					√	√	√	√	√									
						Oralit 250cc/Kp					√													
						Nebu Nacl 0.9%/8j					√	√	√	√	√	√								
						Chloralhidrat 8,5cc/8j									√	√								
						Diazepam 10mg/8j									√	√								
						Nebu Ventolin 0,9%/8j										√	√	√	√					
						Norepineprin 0,5ml/j	X	X	X								X	X	X					
						Fentanil 1mcq-0,86ml/j			X	X	X						X							
						Miloz 1 mcq-2,58ml/j				X						X		X						
						Dopamin 10mcq-2ml/j	X	X							X									
Rf 20ml/j	X	X							X			X	X											
11	1th 7bln/ 10kg	P	Epilepsi, virus ensefalitis, asidosis metabolik, hipokalemia, sepsis	Membaik	6 hari	Cefotaxime 50mg/6j	√	√	√	√	√	√						3	2	CVC	Tidak			
						Paracetamol 100mg/Kp	√	√	√	√														
						Ranitidine 10mg/12j	√	√	√															
						Fenitoin 25mg/12j	√	√		√	√	√												
						Midazolam 1ml/j	X	X	X	X	X	X												
						D5 1/2 N5-40ml/j	X	X	X	X														
Fentanil 1mcq-0,2ml/j			X	X	X	X																		
12	5th 8bln/ 20kg	P	Epilepsi, ortostatik pneumonia, perkembangan tertunda, gizi kurang, sepsis	Membaik	3 hari	As.Valproat 6ml/12j	√	√	√								5,3333	2	CVC	Tidak				
						Vankomisin 500mg/6j	√	√																
						Haloperidol 2x1 pilv	√	√	√															
						Paracetamol 200mg/Kp	√	√																
						Fenitoin 100mg/12j	√	√	√															
						Diazepam 6mg/x	√	√	√															
D5 1/2 N5-40ml/j	X	X	X																					

No	Usia / BB	JK	Diagnosa	Satus keluar	LOS	Nama obat dan Nama Cairan IV	Jumlah Obat dan Cairan / Hari										Rata rata Penggunaan Obat Rawat Inap	Rata rata Penggunaan Obat 1 Waktu	Jalur IV	Kejadian <i>Phlebitis</i> ya/tidak	
							1	2	3	4	5	6	7	8	9	10					
13	1,5bln/16kg	L	Syok Kardiogenik, sepsis, hipokalemia berat	Meninggal	5 hari	Cefotaxime 300mg/8j	√	√	√	√	√							4	2	CVC	Tidak
						Furosemid 6mg/6j		√	√	√											
						Ranitidine 10mg/12j		√													
						Sucralfat 125mg/6j			√	√	√										
						Ca Glukosa 6ml/20mnt			√	√	√										
						Rf 25ml/j	X	X													
						Dopamine 10mcq-2ml/j	X	X	X												
						Dobutamine 2mg-1ml/j	X	X	X												
						Ketamin 10mcq-1ml/j			X	X	X										
14	5th 2bln/13kg	L	Gizi buruk marasmuk, hipokalsemia, anemia kronik, sepsis	Membaik	3 hari	Cefotaxime 650mg/8j	√	√	√								4,3333	2	CVC	Tidak	
						Paracetamol 130mg/4j	√	√	√												
						Ondansentron 2mg/8j	√														
						As.volat 5mg/24j		√	√												
						Zink 20g/24j		√	√												
						Amidaron 5mg/24j		√	√												
						D5 1/4 N5 20ml/j	X														
						Fentanil 1mcq-0,26ml/j	X	X	X												

No	Usia / BB	JK	Diagnosa	Satatus keluar	LOS	Nama obat dan Nama Cairan IV	Jumlah Obat dan Cairan / Hari										Rata rata Penggunaan Obat Rawat Inap	Rata rata Penggunaan Obat 1 Waktu	Jalur IV	Kejadian <i>Phlebitis</i> ya/tidak		
							1	2	3	4	5	6	7	8	9	10						
15	16th/ 48kg	P	<i>Phlebitis</i> , hipokalsemia, hipertensi st 2, edema cerebri, hipematremia, sepsis	Meninggal	7 hari	Cefotaxime 200mg/hr	√	√	√	√								3,7142	1	PVC	Ya	
						Manitol 0,5g/8j	√	√	√													
						Amlodipin 60mg/24j	√	√	√	√	√	√	√									
						Paracetamol 500mg	√	√	√	√	√	√	√									
						Omeprazole 40mg/12j	√	√	√	√	√	√	√									
						Sucralfat 500mg/4j	√		√	√	√	√	√									
						Dexamethason 7,5mg/6j	√	√	√	√												
						Ca Glukosa 10%/20cc	√	√														
						Fluconazole 400mg/24j					√	√	√									
						Meropenem 200mg/8j					√	√										
					Furosemide 20mg				√													
16	15th/ 50kg	L	Syok hemonegik, SAH, CKB, anemia, hiponatremia, sepsis, hipoalbumin	Meninggal	6 hari	Manitol 0,5g/6j	√	√	√	√	√	√					6,3333	1	CVC	Tidak		
						Cefriaxone 2mg/12j	√	√	√	√												
						Fenitoin 5mg/24j	√	√	√	√	√	√										
						Amlodipin 60mg/24j	√															
						Furosemid 0,5mg	√															
						Paracetamol 500mg/Kp	√	√														
						Immodipin 60mg/24j		√	√													
						Sucralfat 500mg/6j		√	√	√												
						Vankomisin 500mg/6j		√		√	√	√										
						Meropenem 1g/8j					√	√										
						NaCl 0,9% /8j					√	√										
						Omeprazole 40mg/12j		√	√	√	√	√										
						Rf 1ml/j	X	X														
						Fentanil 2mcq-3ml/j	X	X	X	X												
Midazolam 1mcq-3ml/j		X	X	X	X																	
Dopamine 5mcq-2ml/j				X	X	X																

No	Usia / BB	JK	Diagnosa	Satatus keluar	LOS	Nama obat dan Nama Cairan IV	Jumlah Obat dan Cairan / Hari										Rata rata Penggunaan Obat Rawat Inap	Rata rata Penggunaan Obat 1 Waktu	Jalur IV	Kejadian <i>Phlebitis</i> ya/tidak			
							1	2	3	4	5	6	7	8	9	10							
17	8bln/5kg	L	<i>Phlebitis</i> , sepsis, down syndrome, gizi kurang, hipotiroid	Membaik	7 hari	Ceftriaxone 100mg/hr	√	√	√	√	√	√	√						7,428	1	PVC	Ya	
						Captopril 2mg/12j	√	√	√	√	√	√	√										
						Furosemide 2,5mg/12j	√	√	√	√	√	√	√										
						Amiodaron 8ml/j	√	√	√	√	√	√	√										
						Zink 20g/24j	√	√	√	√	√	√	√										
						Paracetamol 500mg/6j	√	√	√	√	√	√	√										
						Lacto B Isach/12j	√	√	√	√	√	√	√										
						KCL 3X60g							√										
						Metilprednisolon 5mg/12j							√										
						Nebu Adrenalin 8j/Kp							√										
						Salbutamol 50g/6j	√	√	√	√	√	√	√										
D5 1/2 N5 42ml/j	X	X	X	X	X	X	X																
Midazolam 2mcq-0,2ml/j		X	X	X	X	X	X																
18	1th/7kg	P	Sepsis, pneumonia dextra, hipoglikemia, syok hipokalemia	Meninggal	3 hari	Ceftriaxone 350 mg/12j	√	√	√								2,666	2	CVC	Tidak			
						Paracetamol 70mg/8j	√	√	√														
						Furosemide 3mg/12j		√	√														
						Norepineprine 0,3mcq-0,7ml/j	X	X	X														
						Epineprin 0,3mcq-1ml/j	X	X	X														
						Dopamin 10mcq-2ml/j	X	X	X														
						Ketamin 10mcq-2ml/j			X														
						Rf 8ml/j			X														
						Fentanil 1mcq-0,8ml/j		X															
Dobutamin 5mcq-1,5ml/j	X	X	X																				
19	5bln/5kg	L	<i>Phlebitis</i> , sepsis, down syndrome, hipokalemia, hiponatremia, anemia	Meninggal	3 hari	Ceftriaxone 300mg/12j	√	√	√							4,666	2	PVC	Ya				
						Furosemide 0,5mg/12j	√	√	√														
						Captopril 0,5mg/12j	√	√	√														
						Nebu Ventolin 15 drip/8j	√																
						Transfusi PRC 25ml/4j		√															
						Sucralfat 125mg/6j		√															

No	Usia / BB	JK	Diagnosa	Satatus keluar	LOS	Nama obat dan Nama Cairan IV	Jumlah Obat dan Cairan / Hari										Rata rata Penggunaan Obat Rawat Inap	Rata rata Penggunaan Obat 1 Waktu	Jalur IV	Kejadian Phlebitis ya/tidak	
							1	2	3	4	5	6	7	8	9	10					
						Ranitidin 5mg/12j															
						Salep Cloramfenikol 2Xue			√												
						NaCl 0,9% 36cc-9ml/j	X	X	X												
						KCL 50ml/j	X	X	X												
						D5 1/2 N5 42ml/j	X	X	X												
						Midazolam 1mcq		X													
						Midazolam 3mcq-0,75ml/j		X	X												
						Fentanil 0,1ml/j			X												
						Dopamin 5mcq-0,1ml/j			X												
20	4bln/4,2kg	L	Sepsis, hiperkalsemia, anemia, asidosis respiratorik, epilepsi, pneumonia aspirasi	Meninggal	3 hari	Ceftriaxone 250 mg/12j	√	√	√								4,666	2	CVC	Tidak	
						Nebu Ventolin 1 resp/8j	√	√	√												
						Azitromicine 15mg/24j			√												
						Chloralhidrat 2cc/8j		√													
						Diazepam 0,3 mg/8j		√	√												
						Paracetamol 70mg/8j	√	√													
						Furosemid 2mg/8j		√	√												
						D5 1/4 N5 1ml/j	X														
						ASI 17cc/j	X	X	X												
						Midazolam 3mcq-0,75ml/j		X	X												
						Fentanil 1mcq-0,1ml/j		X	X												
						Norepineprin 0,5ml/j		X	X												
21	8bln/10kg	L	ISK, sepsis, edema, epilepsi, anemia	Membaik	7 hari	Ampicillin 1250mg/6j	√	√	√	√	√	√					4,428	1	CVC	Tidak	
						Vankomisin 500mg/6j	√	√	√	√	√	√									
						Paracetamol 150mg/8j	√	√	√	√	√	√	√								
						Ranitidine 10mg/8j	√	√	√	√	√										
						Ondansentron 1,5mg/8j			√	√	√	√									
						Nebu Adrenalin 8j/Kp			√	√	√										

No	Usia / BB	JK	Diagnosa	Satatus keluar	LOS	Nama obat dan Nama Cairan IV	Jumlah Obat dan Cairan / Hari										Rata rata Penggunaan Obat Rawat Inap	Rata rata Penggunaan Obat 1 Waktu	Jalur IV	Kejadian <i>Phlebitis</i> ya/tidak
							1	2	3	4	5	6	7	8	9	10				
						Rf 10ml/j	X	X	X											
						Midazolam 1mcq-0,6ml/j		X	X	X	X	X	X							
						Fenitoin 1mcq-0,2ml/j		X	X	X	X	X	X							
22	10th 6bln/ 22kg	P	HIV std 4, gizi buruk, sepsis, hipoalbumin'	Membaik	3 hari	Tenovofir 150mg/12j	√	√	√								5,666	1	CVC	Tidak
						Vankomisin 500mg/6j	√	√	√											
						Lamifudine 75mg/12j	√	√	√											
						Cotrimoxazole 480mg/24j	√	√	√											
						Furosemide 20mg/12j	√	√	√											
						Paracetamol 250mg/12j			√											
						D5 1/2 N5 34ml/j	X	X												
						Norepineprin 0,5ml/j		X	X											
23	5bln/ 7,3kg	L	ISK, edema, anemia, sepsis	Membaik	4 hari	Manitol 0,5g/8j	√	√	√								3,25	1	CVC	Tidak
						Metronidazole 300mg/8j	√	√	√	√										
						Paracetamol 10mg/8j		√		√										
						Diazepam 0,3mg/8j		√												
						Cefotaxime 40mg/12j		√	√	√										
						D5 1/2 N5 15ml/j	X	X	X	X										
						Rf 8ml/j		X	X											

البحر الإسلامي للأندلس

No	Usia / BB	JK	Diagnosa	Satatus keluar	LOS	Nama obat dan Nama Cairan IV	Jumlah Obat dan Cairan / Hari										Rata rata Penggunaan Obat Rawat Inap	Rata rata Penggunaan Obat 1 Waktu	Jalur IV	Kejadian <i>Phlebitis</i> ya/tidak
							1	2	3	4	5	6	7	8	9	10				
24	14th 5bln/ 43kg	P	Sepsis, menstruasi h- 1, GIT bleending, gizi kurang, hiponatremia	Membaik	4 hari	Cefriaxone 50mg/12j	√	√	√	√							3,5	2	CVC	Tidak
						Metronidazole 300mg/8j	√	√	√	√										
						Ketorolac 30mg/8j	√	√	√											
						Omeprazole 40mg/12j	√	√		√										
						Rf 20ml/j	X	X	X											
25	5th 8bln/ 20kg	L	Hiperglikemia, syok hemarogenik, trauma, stres, sepsis	Meninggal	3 hari	Manitol 1g/6j	√	√	√							5,333	1	CVC	Tidak	
						Cefotaxime 1g/6j	√	√	√											
						Metronidazole 300mg/8j	√	√	√											
						Omeprazole 20mg/12j	√	√	√											
						Sucralfat 500mg/6j	√	√	√											
						Furosemid 20mg	√													
						Rf 20ml/j	X													
						Insulin 0,1mg-0,5ml/j		X												
						Transfusi PRC 250cc/4j-0,4ml/j		X	X											
Dobutamin 5mcq-1,5ml/j			X																	

No	Usia / BB	JK	Diagnosa	Satatus keluar	LOS	Nama obat dan Nama Cairan IV	Jumlah Obat dan Cairan / Hari										Rata rata Penggunaan Obat Rawat Inap	Rata rata Penggunaan Obat 1 Waktu	Jalur IV	Kejadian <i>Phlebitis</i> ya/tidak	
							1	2	3	4	5	6	7	8	9	10					
26	17th/ 46kg	L	Cidera kepala berat, sepsis, anemia, hipokalemia	Meninggal	6 hari	Cefriaxone 2g/12j	√	√	√	√	√		√				6,5	1	CVC	Tidak	
						Ranitidin 50mg/8j	√	√	√	√	√										
						Ketorolac 30mg/6j	√	√													
						As. Tranexamat 600mg/8j	√	√	√	√	√										
						Aminofillin 1mg/24j	√	√	√	√	√										
						Furosemide 60mg/8j	√														
						Paracetamol 10mg/6j	√	√		√	√	√	√								
						Sucralfate syrup 1g/6j		√	√												
						Metronidazole 300mg/8j			√	√	√	√	√								
						Methylprednisolon 600mg/6j					√										
						Diazepam 0.8mg/8j					√										
						Amidaron 5mg/24j	X	X													
						Fentanil 1mcq-1,2ml/j	X		X	X		X									
						Propofol 41mcq-4ml/j	X		X	X											
Dopamin 10mcq-2ml/j				X	X																
Transfusi PRC 200cc-50ml/j				X	X	X															

البحر الإسلامي للأندلس

No	Usia / BB	JK	Diagnosa	Satatus keluar	LOS	Nama obat dan Nama Cairan IV	Jumlah Obat dan Cairan / Hari										Rata rata Penggunaan Obat Rawat Inap	Rata rata Penggunaan Obat 1 Waktu	Jalur IV	Kejadian <i>Phlebitis</i> ya/tidak	
							1	2	3	4	5	6	7	8	9	10					
27	5bln/ 4,1kg	P	Epilepsi, skoliosis, sepsis	Membaik	5 hari	Cefotaxime 200mg/6j	√	√	√	√	√							3,8	1	CVC	Tidak
						Paracetamol 10mg/Kp	√	√													
						Fenobarbital 16mg/8j	√	√	√	√											
						Azithromycin 400mg/8j		√	√	√	√										
						Furosemide 6mg/6j		√	√	√	√										
						Rf 1ml/j	X	X	X	X	X										
						Midazolam 400mcq-2ml/j	X	X													
28	1,5bl n/6kg	L	Syok kardiogenik, hipotermia berat, sepsis	Meninggal	5 hari	Cefatoxime 300mg/8j	√	√	√	√	√						3,8	2	CVC	Tidak	
						Vankomisin 500mg/6j	√														
						Furosemide 6mg/6j		√	√	√	√										
						Ranitidin 6mg/12j		√	√	√											
						Omeprazole 20mg/12j		√													
						Sucralfat 125mg/6j			√	√											
						Ca Glukosa 6ml/20mnt			√	√	√										
						Dopamin 10mg-2ml/j	X	X	X												
Dobutamin 5mcq-1ml/j	X	X	X																		

البحر الإسلامي للأندلس

No	Usia / BB	JK	Diagnosa	Statatus keluar	LOS	Nama obat dan Nama Cairan IV	Jumlah Obat dan Cairan / Hari										Rata rata Penggunaan Obat Rawat Inap	Rata rata Penggunaan Obat 1 Waktu	Jalur IV	Kejadian <i>Phlebitis</i> ya/tidak	
							1	2	3	4	5	6	7	8	9	10					
						Ketamin 10mcq-1ml/j	X	X	X												
						D5 1/2 N5 15ml/j			X	X	X										
						Morphin 10mcq-1ml/j		X	X												
						Rf 1ml/j	X			X											
29	9th/40kg	L	<i>Phlebitis</i> , epilepsi, gizi baik, upper GIT bleeding, hematuria, sepsis	Membaik	9 hari	Cefotaxime 2g/8j	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	5,333	1	PVC	Ya
						Omeprazole 20mg/12j	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√				
						Sucralfat 125mg/6j	√	√	√	√	√	√									
						Paracetamol 15mg/6j	√		√	√	√	√	√		√						
						Metronidazole 7,5mg/8j	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√				
						Vankomisin 500mg/6j				√	√	√	√	√							
						Gentamicine 1,7mg/8j									√						
						Ampicilline 250mg/6j									√	√					
						Rf 10ml/j	X	X													
						Albumin 20%-2ml/j		X	X												
						D12,5%-16,6ml/j		X	X	X	X	X	X	X	X	X					

البحر الإسلامي للأندلس

No	Usia / BB	JK	Diagnosa	Satatus keluar	LOS	Nama obat dan Nama Cairan IV	Jumlah Obat dan Cairan / Hari										Rata rata Penggunaan Obat Rawat Inap	Rata rata Penggunaan Obat 1 Waktu	Jalur IV	Kejadian <i>Phlebitis</i> ya/tidak
							1	2	3	4	5	6	7	8	9	10				
30	8th 11bln /18kg	P	Anemia, hipokalsemia, sepsis, pneumonia	Membaik	3 hari	Cefriaxon 50mg/hr	√	√	√								4,333	2	CVC	Tidak
						Metronidazole 15mg/8j	√													
						Gentamicine 2,5mg/12j	√													
						Ketorolac 15mg/8j	√	√	√											
						Paracetamol 200mg/Kp	√	√	√											
						Ranitidine 25mg/12j		√	√											
						Rf 1ml/j	X	X	X											
						Fentanil 1mcq-0,2ml/j	X	X	X											
31	1th 3bln/ 6,8kg	L	<i>Phlebitis</i> , gizi buruk, hipotiroid, sepsis, down syndrome, pneumonia berat	Membaik	8 hari	Cefotaxime 50mg/6j	√	√	√	√	√	√	√	√		5,75	2	PVC	Ya	
						Paracetamol 200mg/Kp	√	√	√	√	√	√	√	√						
						Acyclovir 200mg/12j	√	√	√	√	√									
						Vankomisin 500mg/6j	√	√	√											
						Furosemide 40mg/6j		√	√	√	√	√	√	√						
						Chloramfenikol 50mg/kg		√	√	√	√	√	√	√						
						Omeprazole 20mg/12j				√	√		√	√						
						Chloralhidrate 500mg/30mnt							√	√						

No	Usia / BB	JK	Diagnosa	Satatus keluar	LOS	Nama obat dan Nama Cairan IV	Jumlah Obat dan Cairan / Hari										Rata rata Penggunaan Obat Rawat Inap	Rata rata Penggunaan Obat 1 Waktu	Jalur IV	Kejadian <i>Phlebitis</i> ya/tidak	
							1	2	3	4	5	6	7	8	9	10					
						D5 1/4 N5 1ml/j	X	X	X				X	X							
						Fentanil 2mcq-0.27ml/j		X		X	X		X								
						Ketamine 10mcq-2ml/j		X		X	X	X		X							
32	3th 1bln/ 12,5kg	P	Sepsis,hiperleukemia,hipernatremia,asidosis akut, epilepsi	Meninggal	4 hari	Cefotaxime 600mg/6j	√	√	√	√							4,75	3	PVC	Tidak	
						Gentamicine 2,5mg/12j	√	√	√	√											
						Paracetamol 12mg/4j	√	√	√	√											
						Furosemid 1mg/12j	√	√	√	√											
						Ranitidine 15mg/12j	√	√	√												
						D5 1/4 N5 14,2ml/j	X	X													
						Dopamin 2ml/j			X	X											
						Midazolam 1mcq-0,33ml/j			X	X											
						Norepinephrine 0.05mcq-1ml/j	X	X													
						Fentanil 1mcq-0,25ml/j	X	X		X											
33	1th/5,7kg	P	Sepsis, gizi buruk, anemia, hiponatremia, hipokalemia, pneumonia	Membaik	3 hari	Ampicillin 300mg/6j	√	√	√								7	3	CVC	Tidak	
						Metronidazole 45mg/12j	√	√	√												
						Vankomisin 500mg/6jj	√	√	√												

No	Usia / BB	JK	Diagnosa	Satatus keluar	LOS	Nama obat dan Nama Cairan IV	Jumlah Obat dan Cairan / Hari										Rata rata Penggunaan Obat Rawat Inap	Rata rata Penggunaan Obat 1 Waktu	Jalur IV	Kejadian <i>Phlebitis</i> ya/tidak
							1	2	3	4	5	6	7	8	9	10				
						Zink 20g/24j	√	√	√											
						Sanbaplex 0,3ml/24j	√	√	√											
						Nebu Nacl 0,9% 3cc/6j	√	√	√											
						Chloralhidrate 0,1ml/kg	√													
						Paracetamol 60mg/8j		√	√											
						Fentanil 1mcq-0.1cc/j	X	X	X											
						Rf 25cc/j	X	X	X											
34	1th 11bln /5,8kg	P	Gizi buruk, sepsis, hipoalbumin, anemia, pneumonia	Membaik	8 hari	Ceftazidime 300mg/12j	√									3	1	CVC	Tidak	
						Furosemide 3mg/12j	√	√	√	√	√	√	√	√						
						Vankomisin 500mg/6j	√	√	√	√	√	√	√	√						
						Paracetamol 60mg/8j	√	√	√	√	√	√	√	√						
						Zink 20g/24j	√	√	√	√	√									
						Sanbaplex 0,3ml/24j		√	√											
						Salep Miconazole 3Xue		√	√	√	√	√								
						Chloralhidrate 0.1ml/8j						√	√	√						
						Diazepam 0.,1mg/8j						√	√	√						

No	Usia / BB	JK	Diagnosa	Satatus keluar	LOS	Nama obat dan Nama Cairan IV	Jumlah Obat dan Cairan / Hari										Rata rata Penggunaan Obat Rawat Inap	Rata rata Penggunaan Obat 1 Waktu	Jalur IV	Kejadian <i>Phlebitis</i> ya/tidak
							1	2	3	4	5	6	7	8	9	10				
						Calnic 2,5ml/24j									√					
						Midazolam 6mg-1,3ml/j	X	X	X	X	X	X	X	X						
						Fentanyl 1mcq-0,2ml/j		X	X	X	X	X								
						Ketamin 10mcq/kg/mnt		X						X						
						Morfin 20mcq/kg/mnt			X	X		X								
						Transfusi PRC 15cc/j				X	X									
						D10% 5ml/kg-30cc			X	X			X	X						
35	1th/25kg	P	Anemia, sepsis, syok hipovolemik, hidronefrosis	Membaik	5 hari	Cefriaxone 75mg/24j	√	√	√		√					7,6	1	CVC	Tidak	
						Calcitriol 0,25mcq/24j	√	√	√	√	√									
						Allupurinol 100mg/12j	√	√	√	√	√									
						Vankomisin 500mg/6j	√	√	√	√	√									
						Furosemide 0,5mg/12j														
						Paracetamol 250mg/Kp	√	√	√	√	√									
						Kalk 250mg/12j		√	√	√	√									
						Nacl 500mg/8j		√	√	√	√									
						Cefotaxime 62g/12j		√	√	√	√									

No	Usia / BB	JK	Diagnosa	Satatus keluar	LOS	Nama obat dan Nama Cairan IV	Jumlah Obat dan Cairan / Hari										Rata rata Penggunaan Obat Rawat Inap	Rata rata Penggunaan Obat 1 Waktu	Jalur IV	Kejadian <i>Phlebitis</i> ya/tidak
							1	2	3	4	5	6	7	8	9	10				
						Microlax 5mg supp				√	√									
						Rf 10cc/j	X	X	X											
						Sodiun Bicarbonat 25cc/j		X			X									
						D5 1/2 N5 60cc/j	X	X		X	X									
						Morfin 20mcq/kg/mnt			X	X										
36	15th/ 25kg	L	Sepsis, pneumonia, gangguan pertumbuhan	Membaik	7 hari	Cefotaxime 625mg/6j	√	√	√	√							5,714	2	CVC	Tidak
						Metronidazole 200mg/8j	√	√	√	√	√	√	√							
						Paracetamol 250mg/6j	√	√	√	√	√	√	√							
						Omeprazole 25mg/12j	√	√			√	√	√							
						Sucralfat 5ml/6j	√	√			√	√	√							
						As.Valproad 10ml/12l			√	√		√	√							
						Nebu Adrenalin 3cc/8j				√										
						Nebu NaCl 0,9% k/p				√	√	√	√							
						Ampicillin 1g/6j					√	√	√							
						Rf 38ml/j	X	X						X						
						Midazolam 1,3ml/j		X			X	X								

البحر الإسلامي للأندلس

No	Usia / BB	JK	Diagnosa	Satatus keluar	LOS	Nama obat dan Nama Cairan IV	Jumlah Obat dan Cairan / Hari										Rata rata Penggunaan Obat Rawat Inap	Rata rata Penggunaan Obat 1 Waktu	Jalur IV	Kejadian <i>Phlebitis</i> ya/tidak	
							1	2	3	4	5	6	7	8	9	10					
37	3th 11bln /14kg	P	Tumor, sepsis, epileptikus, hipokalsemia	Membaik	3 hari	Fentanil 0,5ml/j		X	X	X								2,666	1	CVC	Tidak
						D5 1/4 N5 1ml/j		X	X			X	X								
						Ceftazidime 700mg/6j	√	√	√												
						Paracetamol 10mg/1j	√	√	√												
						Zink 20g/24j			√												
						KCL 3X500mg			√												
						D5 1/2 N5 50ml/j	X	X													
						Rf 10ml/j		X													
NaCl 0,9% 3ml/j	X	X	X																		
38	3th 9bln/ 13kg	L	Epilepsi, anemia, hipokalsemia , gizi kurang, sepsis	Membaik	3 hari	Cefotaxime 650mg/8j	√	√	√								3	1	CVC	Tidak	
						Metronidazole 130mg/8j	√	√	√												
						Paracetamol 130mg/6j	√	√	√												
						Rf 5ml/j	X	X	X												
						Fentanil 1mcq-0,5ml/j	X	X	X												

No	Usia / BB	JK	Diagnosa	Satatus keluar	LOS	Nama obat dan Nama Cairan IV	Jumlah Obat dan Cairan / Hari										Rata rata Penggunaan Obat Rawat Inap	Rata rata Penggunaan Obat 1 Waktu	Jalur IV	Kejadian <i>Phlebitis</i> ya/tidak		
							1	2	3	4	5	6	7	8	9	10						
39	17th 6bln/ 60kg	L	Cidera kepala berat, sepsis, anemia, hipokalemia	Meninggal	6 hari	Cefriaxone 2g/12j	√	√	√	√	√	√						5,666	1	PVC	Tidak	
						Ranitidine 50mg/8j	√	√	√	√	√											
						Ketorolac 30mg/6j	√															
						As. Tranexamat 600mg/8j		√	√	√	√											
						Aminofillin 1mg/24j	√	√	√	√												
						Furosemie 60mg	√	√														
						Paracetamol 10mg/6j	√	√	√		√	√										
						Metronidazole 200mg/8j		√	√	√	√	√										
						Sucralfat syrup		√	√													
						Fentanil 1mcq-2ml/j	X	X	X	X	X	X										
						Midazolam 1mcq-2ml/j	X	X	X	X												
						Transfusi PRC 50cc/j			X	X		X										
Rf 29ml/j				X	X	X																
40	3th/1 2kg	P	Gizi kurang, sepsis, bradikardi, pneumonia, hipelkalemia	Membaik	3 hari	Metilprednisolon 8mg/8j	√	√	√								5	1	CVC	Tidak		
						Paracetamol 150mg/4j	√	√														
						Furosemide 50mg/8j	√															

No	Usia / BB	JK	Diagnosa	Satatus keluar	LOS	Nama obat dan Nama Cairan IV	Jumlah Obat dan Cairan / Hari										Rata rata Penggunaan Obat Rawat Inap	Rata rata Penggunaan Obat 1 Waktu	Jalur IV	Kejadian <i>Phlebitis</i> ya/tidak
							1	2	3	4	5	6	7	8	9	10				
						Chloralhidrate 0,5cc	√	√	√											
						Cefotaxime 500mg/6j	√	√												
						As.Falproat 100ml/12j	√	√	√	√										
						Rf 10ml/j	X	X	X	X										
						Midazolam 1mcq-2ml/j	X	X	X	X										
41	1th/10kg	L	Syok kardiogenik, sepsis, hipotermia berat	Membaik	4 hari	Cefotaxime 200mg/8j	√	√	√	√						2,25	1	CVC	Tidak	
						Omeprazole 5mg 1x1	√	√		√										
						Furosemide 50mg/8j		√												
						Paracetamol 125mg/Kp				√										
						D5 1/4 N5 10ml/j	X	X	X											
						Fentanil 1mcq-0,2ml/j			X	X										
42	1,5bln/3,5kg	P	Gizi kurang, sepsis, kista, hipoalbumin, stress	Membaik	6 hari	Cefotaxime 1g/8j	√	√	√	√	√	√				3,833	1	CVC	Tidak	
						Metronidazole 30mg/8j	√	√	√	√	√	√								
						Fentanil 1mg/kg		√	√	√	√									
						Paracetamol 500mg/8j				√	√									
						Sanbaplex 0,66cc/24j					√	√								

البحر الإسلامي للأندلس

No	Usia / BB	JK	Diagnosa	Satatus keluar	LOS	Nama obat dan Nama Cairan IV	Jumlah Obat dan Cairan / Hari										Rata rata Penggunaan Obat Rawat Inap	Rata rata Penggunaan Obat 1 Waktu	Jalur IV	Kejadian <i>Phlebitis</i> ya/tidak
							1	2	3	4	5	6	7	8	9	10				
						Vit K 10mg					√	√								
						Metilprednisolon 10mg/24j						√								
						D10 1/4 Na2K1Ca1 8,8ml/j	X	X	X	X	X	X								
						Fentanil 3mcq-0,14ml/j				X	X	X								
						AA 40cc-1,5ml/j			X	X	X	X								
43	15th 4b1b/ 60kg	P	Sepsis, edema celebri, hiperkalsemia, epilepsi, peradangan vena dan bengkak	Meninggal	5 hari	Cefotaxime 2g/8j	√	√									7,4	2	PVC	Ya
						Ranitidin 4mg/8j	√	√	√	√	√									
						Ketorolac 30mg/8j	√	√												
						Omeprazole 15mg/12j	√	√	√	√	√									
						Vankomisin 500mg/6j	√	√	√	√	√									
						As. Tranexamat 600mg/8j	√	√	√	√										
						Sucralfate 500mg/6j	√	√	√	√										
						Paracetamol 500mg/Kp	√	√	√		√									
						Ketorolac 300mg/8j	√	√	√	√										
						Nebu NaCl 0,9%/8j				√	√									
						D5 1/4 N5 20ml/j	X	X	X	X	X									

No	Usia / BB	JK	Diagnosa	Satatus keluar	LOS	Nama obat dan Nama Cairan IV	Jumlah Obat dan Cairan / Hari										Rata rata Penggunaan Obat Rawat Inap	Rata rata Penggunaan Obat 1 Waktu	Jalur IV	Kejadian Phlebitis ya/tidak
							1	2	3	4	5	6	7	8	9	10				
						Insulin 0,1mg-0,1ml/j				X	X									
						Rf 10m/j	X		X	X										
44	4th 3bln/14,5kg	P	Hipoglikemia, GIT bleeding, anemia, epilepsi, sepsis	Meninggal	5 hari	Lansoprazole 30mg/6j	√	√	√	√	√						7,6	1	CVC	Tidak
						Vit K 10mg	√	√	√	√	√									
						Urdafolk 150mg/12j	√	√	√	√	√									
						Furosemide 20mg/6j	√	√	√	√	√									
						Omeprazole 15mg/12j	√	√	√	√	√									
						Sucralfate 250mg/6j	√	√	√		√									
						Lactulosa 5cc/8j	√	√	√	√	√									
						Vankomisin 500mg/6j		√	√	√										
						Cafotaxime 750mg/6j			√											
						Rf 50ml/j	X	X	X		X									
						Fentanil 8,5ml/j			X	X	X									
						Dopamin 10mcq-2ml/j			X	X										

No	Usia / BB	JK	Diagnosa	Satatus keluar	LOS	Nama obat dan Nama Cairan IV	Jumlah Obat dan Cairan / Hari										Rata rata Penggunaan Obat Rawat Inap	Rata rata Penggunaan Obat 1 Waktu	Jalur IV	Kejadian <i>Phlebitis</i> ya/tidak		
							1	2	3	4	5	6	7	8	9	10						
45	1th 4bln/ 6,5kg	P	Kista,gizi buruk, sepsis, hipokalemia, hipoalbumin	Membaik	7 hari	Cefotaxime 200mg/8j	√	√	√	√	√	√	√					6,4285	1	CVC	Tidak	
						Lansoprazole 30mg/6j	√	√	√	√	√	√	√									
						Vankomisin 500mg/6j	√				√	√	√									
						As.Folat 0,3mg/24j	√			√			√									
						Zink 20g/24j	√			√	√	√	√									
						Paracetamol 15mg/Kp	√	√	√	√		√	√									
						Ketorolac 300mg/8j		√														
						Furosemid 500mg/8j		√	√	√	√											
						Ondansentron 4mg/8j			√		√	√										
						KCL 3X500mg			√	√	√	√	√									
						Fentanil 1mcq-0,13ml/j	X	X	X	X	X	X	X									
						Transfusi Albumin 1g-1ml/j	X	X	X			X										
						Rf 5ml/j				X	X		X									
46	10th/ 20kg	L	Epilepsi, gizi baik, hiperkalemia, sepsis, hiponatremia, disabilitas intelektual	Membaik	8 hari	Cefotaxime 2g/8j	√										3,875	1	CVC	Tidak		
						Fenobarbital 16mg/8j	√	√	√	√	√	√	√	√								
						As.Folat 0,3mg/24j		√	√	√	√											

No	Usia / BB	JK	Diagnosa	Satatus keluar	LOS	Nama obat dan Nama Cairan IV	Jumlah Obat dan Cairan / Hari										Rata rata Penggunaan Obat Rawat Inap	Rata rata Penggunaan Obat 1 Waktu	Jalur IV	Kejadian <i>Phlebitis</i> ya/tidak
							1	2	3	4	5	6	7	8	9	10				
						Nebu Ventoline 24mg/6j					√									
						Furosemide 40mg/8j					√	√	√	√						
						NaCl 0,9%/8j					√	√								
						Fenitoin 90mg/24j						√	√	√						
						Gentamicin salep 3xue						√	√	√						
						Paracetamol 15mg/6j					√	√	√	√	√					
						Rf 5ml/j	X	X	X	X										
						NaCl 3%-10ml/j		X			X	X	X							
						Ca Glukosa 40ml/j	X					X	X	X	X					
47	8th/18kg	P	Epilepsi, sepsis, TB Paru, edema serebri, hiponatremia, gizi buruk	Membaik	5 hari	Cefotaxime 500mg/8j	√	√	√	√	√						4,2	2	CVC	Tidak
						Ondansentron 4mg/8j	√	√	√	√	√									
						Urdafalk 150mg/12j	√	√												
						Ranitidine 4mg/8j	√	√												
						Paracetamol 15mg/Kp	√	√	√											
						Sucralfate 250mg/6j	√	√												
						Sanbaplex 0,6cc/24j				√										

No	Usia / BB	JK	Diagnosa	Satatus keluar	LOS	Nama obat dan Nama Cairan IV	Jumlah Obat dan Cairan / Hari										Rata rata Penggunaan Obat Rawat Inap	Rata rata Penggunaan Obat 1 Waktu	Jalur IV	Kejadian <i>Phlebitis</i> ya/tidak	
							1	2	3	4	5	6	7	8	9	10					
48	4bln/ 7,8kg	L	Epilesi, sepsis, hemia reumilis, pneumonia, syok sepsis	Membaik	3 hari	Dobutamin 5mcq-1,5ml/j			X	X	X							2	2	CVC	Tidak
						Cefotaxime 400mg/6j	√	√	√												
						Paracetamol 15mg/6j	√	√	√												
						Rf 10ml/j	X	X	X												
						Fentanil 0,3ml/j	X	X													
49	6bln/ 8,5kg	L	Epilesi, kegemukan, hipoalbumin, pneumonia, sepsis	Membaik	3 hari	Cefotaxime 400mg/6j		√	√								4,666	1	PVC	Tidak	
						Urdafolk 150mg/12j	√	√	√												
						Metronidazole 650mg/8j		√	√												
						Dexametasone 1,25mg/6j		√	√												
						Nebu NaCl 0,9%/8j		√	√												
						Paracetamol syrup 10cc		√	√												
						Diazepam 0,4ng-0,5cc			√												
						Rf 10ml/j	X	X													
50	8th/2 0kg	L	Gizi kurang, edema cerebri, epilepsi, pneumonia, sepsis	Membaik	10 hari	Ceftazidime 1g/12j	√										2,9	1	CVC	Tidak	
						Gentamicine 80mg/24j	√														

No	Usia / BB	JK	Diagnosa	Satatus keluar	LOS	Nama obat dan Nama Cairan IV	Jumlah Obat dan Cairan / Hari										Rata rata Penggunaan Obat Rawat Inap	Rata rata Penggunaan Obat 1 Waktu	Jalur IV	Kejadian <i>Phlebitis</i> ya/tidak
							1	2	3	4	5	6	7	8	9	10				
						Fenitoin 90mg/12j	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√				
						Ondansentron 4mg/8j	√	√	√	√	√									
						Diazepam 6mg/Kp		√	√	√	√									
						Paracetamol 200mg/Kp		√	√	√	√	√	√		√	√				
						Cefotaxime 20mg/8j			√	√	√	√	√		√	√				
						Midazolam bolus 200mg/kg				√										
						As.Valproat 100ml/12j				√	√	√	√	√	√	√				
						Sucralfate 250mg/6j						√								
						Metilprednisolon 200mg/8j							√	√	√	√				
						Chloralhidrate 80mg/12j								√	√					
						Omeprazole 20mg/12j									√	√				
						D5 1/2 N5 20ml/j	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
						Midazolam 2mg-3,6ml/j			X	X	X	X			X	X				
51	15th/45kg	P	Syok sepsis, menstruasi h-2, hipokalemia, ISK, DM tipe 2, sepsis	Membaik	6 hari	Cefotaxime 2g/8j	√	√	√	√	√	√					5,166	2	PVC	Tidak
						Furosemide 10mg/8j	√	√	√	√	√	√								
						Larix 1mg/8j		√	√											

No	Usia / BB	JK	Diagnosa	Satatus keluar	LOS	Nama obat dan Nama Cairan IV	Jumlah Obat dan Cairan / Hari										Rata rata Penggunaan Obat Rawat Inap	Rata rata Penggunaan Obat 1 Waktu	Jalur IV	Kejadian <i>Phlebitis</i> ya/tidak
							1	2	3	4	5	6	7	8	9	10				
						Myloz 2 ddue		√	√	√	√	√								
						Paracetamol 500mg/6j		√	√	√	√	√								
						Omeprazole 40mg/12j			√											
						Sucralfate 500mg/6j			√											
						Kalium 500mg/8j				√	√	√								
						Natrium Bicarbonat 1g/6j					√	√								
						Midazolam 8,1ml/j	X	X	X	X	X	X								
						Fentanil 0,9ml/j	X	X	X	X	X	X								
						D5 1/2 N5 75ml/j	X	X				X								
						NaCl 0,9%-25ml/j		X	X	X										
52	14th/ 35kg	P	Gizi kurang, hipertensi std 1, hiponatremia, kipokalemia, anemia, alkalosis respiratonik, sepsis	Meninggal	6 hari	Cefotaxime 1g/12j	√	√	√	√	√	√				5	1	CVC	Tidak	
						Omeprazole 40mg/12j	√	√	√	√	√	√								
						Ketorolac 30mg/8j	√													
						Paracetamol 500mg/Kp	√	√	√	√	√	√								
						Furosemide 15mg/8j		√	√											
						Sucralfate 1g/6j			√	√	√	√								
						Metilprednisolone 70mg/6j			√	√		√								
						Cloridine 50mg/8j					√	√								
						D5 1/2 N5 32ml/j	X	X												
						Fentanil 1mcq-0,7ml/j		X		X	X									
						Kalium 33ml/j		X	X			X								
						Natrium 63ml/j	X		X		X	X								

No	Usia / BB	JK	Diagnosa	Satatus keluar	LOS	Nama obat dan Nama Cairan IV	Jumlah Obat dan Cairan / Hari										Rata rata Penggunaan Obat Rawat Inap	Rata rata Penggunaan Obat 1 Waktu	Jalur IV	Kejadian Phlebitis ya/tidak			
							1	2	3	4	5	6	7	8	9	10							
53	8bln/ 6,2kg	L	Gizi kurang, hipoglikemia, sepsis, anemia	Membaik	7 hari	Cetriaxone 50mg/24j	√	√	√	√	√	√	√						3,857	3	CVC	Tidak	
						Paracetamol 120mg/Kp	√	√	√	√	√	√	√										
						Nebu Nacl 0,9%/8j	√	√	√	√	√	√											
						Omeprazole 40mg/12j	√	√	√														
						Chloralhidrate 250mg/12j	√	√				√											
						Nebu Fenitoin 1g/12j						√											
						Midazolam 1mcq-0,76ml/j	X	X	X	X	X	X											
						Fentanil 1mcq-0,1ml/j	X	X	X	X	X												
						D5 1/4 N5 7,5ml/j			X	X	X	X											
Norepineprin 0,5ml/j				X	X	X																	
54	8th/1 5kg	P	Sepsis, gizi buruk, atropi cerebri, pneumonia	Membaik	3 hari	Cefriaxone 50mg/12j	√	√	√								3	1	CVC	Tidak			
						Paracetamol 15mg/8j	√		√														
						Chloramfenikol 50mg/kg	√	√	√														
						Nebu Nacl 0,9%/8j			√														
						Rf 5ml/j	X	X	X														
						Fentanil 0,6ml.j		X	X														
						Flush CVC 6ml/j	X	X	X														
55	2bln/ 4kg	P	Sepsis, edema celebri, hiperkalsemia, epilepsi	Membaik	6 hari	Ceftazidime 1g/12j	√	√	√	√	√	√					5,333	2	CVC	Tidak			
						Azitromicine 15mg/24j	√	√	√	√	√												
						Paracetamol 40mg/8j	√	√	√	√	√	√											
						Chloralhidrate 250mg/12j	√	√	√	√	√	√											
						Natrium Bicarbonat 1g/6j		√	√	√	√	√											
						Fenobarbital 16mg/8j				√	√	√											
						Zink 20g/24j						√											
						D5 1/2 N5 1ml/j	X	X	X	X	X	X											

No	Usia / BB	JK	Diagnosa	Satatus keluar	LOS	Nama obat dan Nama Cairan IV	Jumlah Obat dan Cairan / Hari										Rata rata Penggunaan Obat Rawat Inap	Rata rata Penggunaan Obat 1 Waktu	Jalur IV	Kejadian <i>Phlebitis</i> ya/tidak
							1	2	3	4	5	6	7	8	9	10				
56	12th 3bln/ 50kg	P	Syok kardiogenik, hipotermia berat, paru paru, sepsis	Membaik	4 hari	Cefotaxime 2g/8j	√	√	√	√							4,75	1	CVC	Tidak
						Metronidazole 7,5/8j	√	√	√	√										
						Ranitidin 2mg/6j	√	√	√	√										
						Paracetamol 480mg/6j	√	√	√	√										
						Ketorolac 30mg/6j	√	√	√											
						Combiflex 48ml/j	X	X												
Albumin 25% -2,5ml/j		X	X	X																
57	12th/ 36kg	P	Sepsis, epilepsi, hiperkalsemia, pneumonia	Membaik	3 hari	Ceftriaxone 20mg/6j	√	√	√							2,666	1	CVC	Tidak	
						Captopril 2,5mg/6j	√	√	√											
						Spirolonaktone 60mg/12j			√											
						Paracetamol 480mg/6j			√											
						Rf 10ml/j	X	X	X											
Dobutamin 5mcq-1ml/j	X	X	X																	
58	15th/ 34kg	P	Anemia, sepsis, hipoalbumi, trauma tumpul vaskuler	Membaik	6 hari	Ceftriaxone 1g/12j	√	√	√	√	√	√				4	2	CVC	Tidak	
						Ketorolac 30mg/6j		√	√	√	√	√								
						Paracetamol 480mg/6j		√	√	√	√	√								
						Gentamicin salep 3xue				√	√	√								
						Dexametasone 1,25mg/6j				√										
						Aspilet 5mg/6j					√	√								
						Furosemid 40mg/8j					√									
						Metronidazole 40mg/6j						√								
						Fentanil 1mcq-1ml/j	X	X			X	X								
Heparin 3,6ml/j		X	X	X	X															
Rf 15ml/j		X	X			X														

No	Usia / BB	JK	Diagnosa	Satatus keluar	LOS	Nama obat dan Nama Cairan IV	Jumlah Obat dan Cairan / Hari										Rata rata Penggunaan Obat Rawat Inap	Rata rata Penggunaan Obat 1 Waktu	Jalur IV	Kejadian <i>Phlebitis</i> ya/tidak		
							1	2	3	4	5	6	7	8	9	10						
59	3th/15kg	L	<i>Phlebitis</i> , anemia, edema cerebri, cedera kepala berat, epilepsi, sepsis	Membaik	7 hari	Cefotaxime 2g/8j	√	√	√	√	√	√						6,857	1	PVC	Ya	
						Ketorolac 30mg/6j	√	√	√	√	√											
						Ranitidin 2mg/6j	√	√	√	√	√		√									
						Paracetamol 160mg/6j	√	√		√	√	√	√									
						Omeprazole 5mg/24j	√	√														
						Sucralfat 1g/6j	√	√														
						Erlamycetin salep 2 dd ue	√	√	√	√		√										
						Diazepam 0,3mg/12j		√	√	√	√	√										
						Fenobarbital 16mg/8j			√	√	√	√										
						Azitromicine 15mg/24j				√	√	√										
						Nebu Nacl 0,9%/8j							√	√								
						Metilcobalamin 0,9ug/8j								√	√							
Midazolam 1ml/j					X	X	X	X														
Rf 9,5ml/j	X	X	X				X	X														
60	4th/9kg	P	Gizi buruk, dermafitoris leher, sepsis, pneumonia	Membaik	3 hari	Cafotaxime 750mg/6j	√	√	√								6,333	1	CVC	Tidak		
						Metronidazole 40mg/6j	√	√	√													
						Fluconazole 400mg/24j	√	√	√													
						Paracetamol 240mg/6j	√	√	√													
						Furosemid 40mg/8j		√	√													
						Zink 20g/24j		√	√													
						Sanbaplex 0,6ml/hr		√	√													
						Gentamicin salep 3xue			√													
Dobutamin 5mcq-1,5ml/j	X	X	X																			

No	Usia / BB	JK	Diagnosa	Satatus keluar	LOS	Nama obat dan Nama Cairan IV	Jumlah Obat dan Cairan / Hari										Rata rata Penggunaan Obat Rawat Inap	Rata rata Penggunaan Obat 1 Waktu	Jalur IV	Kejadian <i>Phlebitis</i> ya/tidak	
							1	2	3	4	5	6	7	8	9	10					
61	3th/12kg	P	Epilepsi, hiponatremia, anemia, sepsis	Membaik	3 hari	Ceftriaxone 1g/12j	√	√	√									2,666	2	CVC	Tidak
						Paracetamol 160mg/6j	√	√	√												
						Fenobarbital 16mg/8j		√	√												
						Vascon 0,1mcq-1ml/j	X	X	X												
						RL 45cc/j	X	X	X												
62	6th 4bln/23kg	P	Sepsis, gizi buruk, pneumonia, hipokalsemia	Membaik	8 hari	Cefotaxime 750mg/6j	√	√	√								3,625	1	CVC	Tidak	
						Ranitidin 2mg/6j	√														
						Paracetamol 320mg/6j	√	√	√												
						Flurosemide 3mg/12j	√	√	√												
						Laktulosa 3ml/hr		√	√												
						Vit K 10mg		√	√	√	√										
						Sucralfate syrup 1g/6j		√													
						Meropenem 10mg/8j		√		√	√	√	√	√							
						Sistenol 450mg/x				√	√	√	√	√							
						Rf 9,5ml/j					√										
63	13th/42kg	L	Pneumonia bilateral, sepsis, epilepsi	Membaik	5 hari	Metilprednisolon 60mg/24j	√	√	√	√	√						3,2	1	CVC	Tidak	
						Vankomisin 500mg/6j	√	√	√	√	√										
						Fenitoin 90mg/24j	√														
						Nebu Nacl 0,9%/8j		√	√	√	√										
						Dulcolax 5mg/24j					√										
						D5 1/2 N5 37,5 ml/j		X	X	X	X										

No	Usia / BB	JK	Diagnosa	Satatus keluar	LOS	Nama obat dan Nama Cairan IV	Jumlah Obat dan Cairan / Hari										Rata rata Penggunaan Obat Rawat Inap	Rata rata Penggunaan Obat 1 Waktu	Jalur IV	Kejadian <i>Phlebitis</i> ya/tidak	
							1	2	3	4	5	6	7	8	9	10					
64	2th 1bln/ 12kg	L	Anemia,hipo natremia, epilepsi, hipoalbumin, sepsis	Membaik	7 hari	Cefotaxime 750mg/6j	√	√	√	√	√	√	√					5	2	CVC	Tidak
						Metronidazole 40mg/6j	√	√	√	√	√	√	√								
						Paracetamol 160mg/6j	√	√	√	√	√	√	√								
						Ranitidin 2mg/6j	√	√	√			√									
						Ketorolac 30mg/6j		√	√	√	√	√									
						Flurosemide 3mg/12j		√		√	√	√	√								
						Midazolam 1,4ml/j	X			X	X	X									
						Fentanil 0,2ml/j		X	X	X	X	X									
65	4bln/ 2,7kg	P	Asidosis metabolik berat, hiperkalsemi a, anemia, sepsis, gizi buruk, melena	Meninggal	5 hari	Furosemid 20mg/6j	√	√	√	√	√						5,4	3	CVC	Tidak	
						Vankomisin 500mg/6j	√	√	√	√	√										
						As.Folat 0,1mg/24j	√	√	√	√	√										
						Paracetamol 40mg/6j	√	√	√	√	√										
						Ceftriaxone 50mg/24j		√	√		√										
						Nebu Ventoline 24mg/6j		√	√	√	√										
						D5 1/4 N5 8ml/j	X	X	X	X											
						Midazolam 2mcq-0,48ml/j			X		X										
						Ca Glukosa 40ml/j		X	X	X											
						Fentanil 1mcq-0,14ml/j	X	X		X	X										
66	1th 2bln/ 8,5kg	L	Anemia, sepsis, hipoalbumin, hiponatremia	Membaik	7 hari	Cafotaxime 750mg/6j	√	√	√	√	√	√	√				4,285	3	CVC	Tidak	
						Metronidazole 40mg/6j	√	√	√	√	√	√	√								
						Paracetamol 120mg/Kp	√	√	√	√	√	√	√								
						Ranitidin 2mg/6j		√	√	√	√	√	√								
						Myloz 2 ddue					√	√	√								

No	Usia / BB	JK	Diagnosa	Satatus keluar	LOS	Nama obat dan Nama Cairan IV	Jumlah Obat dan Cairan / Hari										Rata rata Penggunaan Obat Rawat Inap	Rata rata Penggunaan Obat 1 Waktu	Jalur IV	Kejadian <i>Phlebitis</i> ya/tidak
							1	2	3	4	5	6	7	8	9	10				
						Rf 30ml/j	X	X	X	X	X	X	X							
						Fentanil 1mcq-0,34ml/j		X	X	X	X	X	X							
67	2bln/4,5kg	L	Sepsis, epilepsi, hiperkalsemia, pneumonia	Membaik	7 hari	Cefotaxime 150mg/6j	√	√	√	√	√	√	√				4	3	CVC	Tidak
						Metronidazole 30mg/6j	√	√	√	√	√	√	√							
						Paracetamol 40mg/6j	√	√												
						Metilprednisolon 0,25mg/24j	√			√	√	√	√							
						Chloralhidrat 250mg/6j			√	√	√									
						Sistenol 450mg/x			√	√		√	√							
						D10 1/4 Na2K1Ca1 8,8ml/j	X	X	X	X	X	X								
						Norepineprin 0,5ml/j	X	X	X			X	X							
68	1th 6bln/6,5kg	L	Asidosis metabolik, hipoalbumin, anemia, gizi buruk	Membaik	5 hari	Metronidazole 7,5mg/8j	√	√	√	√	√						6,4	2	CVC	Tidak
						Ondansenron 0,15mg/8j	√	√	√	√	√									
						Ranitidine 4mg/8j	√	√	√	√	√									
						Zink 20g/24j	√	√		√	√									
						Paracetamol 120mg/Kp			√	√	√									
						As.Folat 0,1mg/24j	√	√	√	√	√									
						Fentanil 0,13ml/j	X	X	X	X	X									
						Albumin 25%-1cc/j	X	X	X											
69	16th 4bln/49kg	L	<i>Phlebitis</i> , hipertensi std 2, pneumonia bilateral, autoimun	Meninggal	5 hari	Cafotaxime 750mg/6j	√	√	√	√	√						5,4	1	PVC	Ya
						Vankomisin 500mg/6j	√	√												
						Sistenol 450mg/x	√	√	√	√										
						Paracetamol 640mg/6j	√	√	√	√										
						Dexametasone 1,25mg/6j	√			√										
						Chloramfenikol 50mg/kg	√	√	√	√	√									
						Midazolam 1mcq-3ml/j	X	X	X	X	X									
						Morfin 10mcq-1ml/j	X	X	X	X	X									

No	Usia / BB	JK	Diagnosa	Satatus keluar	LOS	Nama obat dan Nama Cairan IV	Jumlah Obat dan Cairan / Hari										Rata rata Penggunaan Obat Rawat Inap	Rata rata Penggunaan Obat 1 Waktu	Jalur IV	Kejadian <i>Phlebitis</i> ya/tidak	
							1	2	3	4	5	6	7	8	9	10					
70	1bln/ 3,8kg	L	Anemia, sepsis, hipokalsemia, aritmia	Membaik	5 hari	Cefrazidime 175mg/8j	√	√	√	√	√							2,6	1	CVC	Tidak
						Flurosemide 3mg/12j	√	√	√	√	√										
						Chloralhidrate 250mg/12j					√										
						Spirolakton 60mg/12j					√										
						As.Folat 0,1mg/24j					√										
						Rf 1ml/j	X														
						Midazolam 1mcq-0,2ml/j	X	X	X												
						Fentanil 1mcq-0,08ml/j	X	X	X	X	X										
71	2bln/ 4,8kg	L	Hipoalbumin, anemia, sepsis, hipokalsemia	Membaik	6 hari	Cefotaxime 50mg/6j	√	√	√	√	√						5	1	CVC	Tidak	
						Metronidazole 7,5/8j	√	√	√	√	√	√									
						Sistenol 450mg/x	√	√	√	√	√	√									
						Vit K 10mg	√	√	√		√										
						Nebu NaCl 0,9%/8j	√	√		√	√										
						Metilprednisolon 0,25mg/24j						√									
						Myloz 2 ddue					√	√									
						Paracetamol 40mg/6j					√	√									
						Rf 1ml/j	X	X	X												
						Fentanil 1mcq-0,1ml/j		X	X	X	X	X									
						Norepineprin 0,5ml/j		X	X			X									

No	Usia / BB	JK	Diagnosa	Satatus keluar	LOS	Nama obat dan Nama Cairan IV	Jumlah Obat dan Cairan / Hari										Rata rata Penggunaan Obat Rawat Inap	Rata rata Penggunaan Obat 1 Waktu	Jalur IV	Kejadian <i>Phlebitis</i> ya/tidak					
							1	2	3	4	5	6	7	8	9	10									
72	9th/25kg	P	Anemia, sepsis, hipokalsemia, alkalosis metabolik, ISK	Membaik	8 hari	Manitol 20% /8j	√	√	√	√	√	√	√	√						5,875	1	CVC	Tidak		
						Cafotaxime 750mg/6j	√	√	√	√	√	√	√	√											
						Furosemide 3mg/12j	√	√	√	√	√	√													
						Paracetamol 400mg/6j		√	√	√	√	√	√	√											
						KCL 3X500mg		√	√	√	√	√	√	√											
						Chloramfenikol 50mg/kg			√																
						Fenobarbital 16mg/8j			√			√	√	√	√										
						Nebu NaCl 0,9%/8j						√													
						As.Falproat 100ml/12j							√	√	√	√									
						D5 1/2 N5 8ml/j	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X									
						Midazolam 1,5ml/j	X	X	X	X	X	X	X	X	X										
73	8th 6bln/16kg	P	Edema celebri, epilepsi, pneumonia, hiperkalemia	Membaik	3 hari	Cafotaxime 750mg/6j	√	√	√	√	√								6,666	2	CVC	Tidak			
						As.Falproat 100ml/12j	√	√	√	√	√														
						Flurosemide 3mg/12j	√	√	√	√	√														
						As.Falproat 100ml/12j	√	√	√	√	√														
						Zink 20g/24j			√	√															
						Paracetamol 320mg/6j			√	√	√														
						Rf 30ml/j	X																		
						Midazolam 1mcq-1cc/ Fentanil 1mcq-0,3cc/j		X	X																
74	4bln/3,5kg	P	Pneumonia bilateral, sepsis, epilepsi	Meninggal	3 hari	Cefotaxime 50mg/6j	√	√	√									4,333	1	CVC	Tidak				
						Metronidazole 7,5/8j	√	√	√																
						Paracetamol 80mg/Kp	√	√	√																
						Myloz 2 ddue	√																		
						Metilprednisolon 0,25mg/24j		√																	
						Ranitidin 2mg/6j		√	√																
Midazolam 0,2ml/j	X	X	X																						

No	Usia / BB	JK	Diagnosa	Satatus keluar	LOS	Nama obat dan Nama Cairan IV	Jumlah Obat dan Cairan / Hari										Rata rata Penggunaan Obat Rawat Inap	Rata rata Penggunaan Obat 1 Waktu	Jalur IV	Kejadian <i>Phlebitis</i> ya/tidak
							1	2	3	4	5	6	7	8	9	10				
75	3bln/ 3,8kg	P	Epilepsi, pneumonia, cerabral CMV, sepsis	Membaik	4 hari	Fenobarbital 15mg/12j	√	√	√	√							4,75	1	CVC	Tidak
						Fenitoin 15mg/6j	√	√	√	√										
						Vankomisin 500mg/6j	√	√	√	√										
						Cefriaxone 50mg/24j	√	√	√	√										
						Sistenol 450mg/x			√	√										
						Myloz 2 ddue			√											
						Rf 1ml/j	X	X	X											
76	1th/7 kg	L	Anemia, sepsis, hipoalbumin, hiponatremia	Meninggal	4 hari	Cefotaxime 2g/6j	√	√	√	√						4,5	1	CVC	Tidak	
						Zink 20g/24j	√	√	√	√										
						As.Falproat 100ml/12j	√	√	√											
						Metilprednisolon 350mg/8j	√	√	√	√										
						Ranitidin 50mg/12j			√	√										
						Sucralfat 10ml/6j				√										
						Norepineprin 0,5ml/j	X	X	X	X										
77	7bln/ 7,9kg	L	Gizi buruk, hipoalbumin, pneumonia, sepsis	Membaik	3 hari	Cefotaxime 2g/6j	√	√	√						4,333	2	CVC	Tidak		
						Metronidazole 7,5mg/8j	√	√	√											
						Paracetamol 80mg/6j	√	√	√											
						Ketorolak 20mg/6j		√	√	√	√									
						Rf 1ml/j	X	X	X	X	X									
						Albumin 25%-1ml/j	X	X	X											

No	Usia / BB	JK	Diagnosa	Satatus keluar	LOS	Nama obat dan Nama Cairan IV	Jumlah Obat dan Cairan / Hari										Rata rata Penggunaan Obat Rawat Inap	Rata rata Penggunaan Obat 1 Waktu	Jalur IV	Kejadian <i>Phlebitis</i> ya/tidak
							1	2	3	4	5	6	7	8	9	10				
78	8th/30kg	P	Diare cair, sepsis, cerebri pneumonia, anemia	Meninggal	5 hari	Cefotaxime 2g/6j	√	√	√	√	√						3	1	CVC	Tidak
						Zink 20g/24j	√	√		√	√									
						Fenobarbital 15mg/12j	√		√	√	√									
						Lakto B 1 saset 3xl			√	√										
						D5 1/2 N5 22ml/j	X	X	X	X	X									
79	10th/25kg	P	Stress ulcer, sepsis, anemia, hipogalionsis	Membaik	3 hari	Cefotaxime 50mg/6j	√	√	√							5	1	CVC	Tidak	
						Metronidazole 7,5/8j	√	√	√											
						Paracetamol 400mg/6j	√	√	√											
						Ranitidine 4mg/8j	√	√	√											
						Ketorolak 20mg/6j	√		√											
						Rf 1cc/j	X	X												
						Fentanil 1mcq-0,5ml/j		X	X											
80	5bln/7,6kg	P	Kista, sepsis, diare, anemia, hipoalbumin	Membaik	6 hari	Cefotaxime 2g/6j	√	√	√	√	√	√				4,5	1	CVC	Tidak	
						Paracetamol 80mg/6j	√	√	√	√	√	√								
						Metronidazole 5mg/8j	√	√	√	√	√	√								
						Flurosemide 3mg/12j	√													
						Myloz 2 ddue					√	√								
						Ranitidin 50mg/12j	√	√	√	√	√	√								
						Midazolam 2,5ml/j	X	X	X	X	X	X								
						Norepineprin 0,5ml/j	X	X	X	X										
Albumin 25% -5ml/j			X	X	X	X														

No	Usia / BB	JK	Diagnosa	Satatus keluar	LOS	Nama obat dan Nama Cairan IV	Jumlah Obat dan Cairan / Hari										Rata rata Penggunaan Obat Rawat Inap	Rata rata Penggunaan Obat 1 Waktu	Jalur IV	Kejadian <i>Phlebitis</i> ya/tidak
							1	2	3	4	5	6	7	8	9	10				
81	13th/ 34kg	L	<i>Phlebitis</i> , sepsis, scabies, liver, hipoalbumin, hiperkalemia, GIT bleeding	Meninggal	10 hari	Cefotaxime 1,5g/6j	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	3,8	2	PVC	Ya
						Furosemid 35mg/4j	√	√		√	√	√	√	√	√	√				
						Ranitidin 50mg/12j	√	√	√	√	√	√								
						Sucralfat 500mg/6j	√	√			√	√								
						Kloralhidrat 3,5ml/6j		√	√	√										
						Vankomisin 500mg/6j				√	√	√								
						Metilprednisolon 35mg/6j				√										
						Paracetamol 350mg/Kp								√	√					
						Albumin 25%-5ml/j	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X				
						D5 1/2 N5 22ml/j	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X				
						Rf 1ml/j	X	X	X	X										
82	1bln/ 4kg	L	Sepsis, ensefalitis bakteri, asidosis metabolik, syok septik, pneumonia	Meninggal	8 hari	Cefotaxime 200mg/8j	√	√	√							4,625	2	CVC	Tidak	
						Ampicillin 200mg/8j	√	√	√											
						Fenobarbital 10mg/12j	√	√	√	√	√	√	√	√						
						Paracetamol 400mg/6j	√	√	√	√	√	√	√	√						
						Nebu Fenitoin 1g/8j		√	√	√	√	√	√	√						
						Meropenem 50mg/8j				√	√	√	√	√						
						Furosemid 4mg/8j					√	√		√						
						Rf 1ml/j	X													
						Dobutamin 5mcq-1ml/j		X	X	X	X	X	X	X						
						Midazolam 1mcq-0,1ml/j		X	X	X										
						Fentanil 1mcq-0,24ml/j		X	X	X		X	X							
						Epinefrin 0,15mcq-3ml/j		X	X	X	X				X					

No	Usia / BB	JK	Diagnosa	Satatus keluar	LOS	Nama obat dan Nama Cairan IV	Jumlah Obat dan Cairan / Hari										Rata rata Penggunaan Obat Rawat Inap	Rata rata Penggunaan Obat 1 Waktu	Jalur IV	Kejadian <i>Phlebitis</i> ya/tidak			
							1	2	3	4	5	6	7	8	9	10							
83	6bln/ 6,2kg	P	ISK, sepsis, hipoalbumin, anemia, epilepsi	Meninggal	6 hari	Cefotaxime 350mg/6j	√	√	√	√	√	√							5,833	1	CVC	Tidak	
						Sistenol 70mg/x	√	√	√	√	√	√											
						Vit K 10mg	√	√	√														
						Zink 20g/24j	√	√	√														
						As.Folat 1mg/24j	√				√	√											
						Lactulosa 5cc/24j	√	√	√	√													
						Carnitin 250mg/12j	√	√	√	√	√	√											
						Sanbaplex 0,2ml/24j	√			√	√	√											
						Norepineprin 0,5ml/j	X	X	X														
Rf 3ml/j			X	X	X	X																	
84	8th 6bln/ 20kg	L	Edema celebri, sepsis, epilepsi, pneumonia, hiperkalemia	Membaik	10 hari	Cefotaxime 1g/12j	√	√	√	√	√	√	√	√				3,7	1	CVC	Tidak		
						Sucralfat syr 5ml/8j	√																
						Vankomis in 500mg/6j	√																
						Omeprazole 20mg/12j	√																
						Furosemid 10mg/12j	√	√	√	√	√												
						Paracetamol 200mg/Kp	√	√	√	√	√	√	√										
						Lisinopril 5mg/24j			√	√	√	√	√	√	√	√	√					√	√
						Amikasin 350mg/24j						√	√	√	√	√	√					√	√
						Sistenol 250mg/Kp									√	√	√					√	√
						Rf 30ml/j	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X					X	X
Heparin 0,6ml/j			X	X	X	X	X	X	X														
85	15th 18bln /43kg	P	Anemia, sepsis, hiponatremia, hipoalbumin	Meninggal	4 hari	Cefotaxime 2g/6j	√	√	√	√							4,5	2	CVC	Tidak			
						Lisinopril 5mg/24j	√	√															
						Paracetamol 500mg/Kp	√	√	√	√													
						Vit K 10mg	√	√	√	√													
						Omeprazole 40mg/12j	√	√	√	√													
						Rf 25ml/j	X	X	X	X													
						Morphin 10mcq-1ml/j			X	X													

No	Usia / BB	JK	Diagnosa	Satatus keluar	LOS	Nama obat dan Nama Cairan IV	Jumlah Obat dan Cairan / Hari										Rata rata Penggunaan Obat Rawat Inap	Rata rata Penggunaan Obat 1 Waktu	Jalur IV	Kejadian <i>Phlebitis</i> ya/tidak					
							1	2	3	4	5	6	7	8	9	10									
86	10th 9bln/ 23kg	L	<i>Phlebitis</i> , hiperglikemia, syok hipovolemik, neutropenia, sepsis	Meninggal	6 hari	Ceftriaxone 1g/12j	√	√	√	√	√	√							6,5	1	PVC	Ya			
						Gentamicin 35mg/8j	√	√	√	√	√	√													
						Ranitidin 25mg/8j	√	√																	
						Ondansentron 4mg/Kp	√	√	√	√	√	√													
						Zink 20g/24j	√	√	√	√	√	√													
						Glukosa 8ml/8j	√																		
						Vankomisin 500mg/6j	√	√	√																
						Kloralhidrat 3,5ml/6j	√																		
						Paracetamol 250mg/Kp	√	√	√	√	√	√													
						Omeprazole 12mg/x		√	√	√	√	√													
						Albumin 20%-2ml/j	X	X	X	X	X	X													
						NaCl 0,9% 27ml/j	X	X	X	X	X	X													
						Rf 25ml/j		X	X	X															
Fentanil 0,4ml/j			X	X	X	X																			
87	1th/1 1kg	P	Gizi kurang, hiperlipidemia, sepsis, epilepsi, biopsi, hipoalbumin	Membaik	7 hari	Cefataxime 500mg/6j	√	√	√	√	√	√						4,285	1	CVC	Tidak				
						Fenobarbital 30mg/12j	√	√	√	√	√	√													
						Ranitidin 10mg/12j	√																		
						Paracetamol 110mg/6j	√	√	√	√	√	√													
						Metilprednisolon 10mg/x		√																	
						CaCo3 500mg/24j		√	√	√	√	√													
						Rf 25ml/j	X	X	X	X	X	X													
						Fentanil 1mcq-0,22ml/j				X	X	X													
D5 1/4 N5 1ml/j				X	X	X																			

No	Usia / BB	JK	Diagnosa	Satatus keluar	LOS	Nama obat dan Nama Cairan IV	Jumlah Obat dan Cairan / Hari										Rata rata Penggunaan Obat Rawat Inap	Rata rata Penggunaan Obat 1 Waktu	Jalur IV	Kejadian <i>Phlebitis</i> ya/tidak							
							1	2	3	4	5	6	7	8	9	10											
88	10 th 6bln/ 23kg	P	Gizi buruk, anemia, pneumonia, sepsis, GIT bleeding, hipotiroid	Membaik	4 hari	Furosemid 20mg/8j	√	√	√	√																	
						Paracetamol 250mg/6j	√	√	√	√																	
						Sucralfat 250mg/8j	√	√	√	√																	
						Ranitidin 25mg/12j	√	√																			
						Cefotaxime 1,1g/6j	√	√	√	√																	
						Caredilol 12,5mg/24j		√	√	√																	
						Aldosteron 12,5mg/24j			√	√																	
						Ketamin 40mcq-4mj	X	X	X																		
						Fentanil 1mcq-1ml/j		X																			
						Dopamin 10mcq-2ml/j	X			X																	
						NaCl 0,9% 1ml/j	X		X	X																	
Rf 25ml/j		X	X	X																							
89	1th 1bln/ 9kg	P	Hipokalemia berat, anemia, alkalosis metabolik, CKD std 5, sepsis	Membaik	10 hari	Ampicillin 450mg/6j	√	√	√			√	√	√		√											
						Vankomisin 500mg/6j	√	√	√	√																	
						Caco3 500mg/24j	√	√	√	√	√	√	√	√	√												
						Zink 20g/24j		√	√	√	√	√															
						As.Folat 1mg/24j		√	√	√	√	√															
						Paracetamol 100mg/6j		√		√	√	√															
						Calcitriol 0,25mcq/24j		√		√	√	√	√	√	√	√	√	√	√								
						Calnic 5cc/24j		√							√	√	√	√									
						Sistenol 100mg/6j				√	√	√															
						Cefotaxime 50mg/6j					√	√	√	√	√	√	√	√	√								
						Nebu Ventoline 24mg/6j											√	√	√								
						Flikonazole 100g/24j											√	√									
						D5 1/4 N5 6ml/j	X																				
						Fentanil 0,2cc/j		X	X	X	X	X															
Norepineprin 0,1ml/j		X	X								X																
Dopamin 5mcq-1ml/j		X	X								X	X	X														

No	Usia / BB	JK	Diagnosa	Satatus keluar	LOS	Nama obat dan Nama Cairan IV	Jumlah Obat dan Cairan / Hari										Rata rata Penggunaan Obat Rawat Inap	Rata rata Penggunaan Obat 1 Waktu	Jalur IV	Kejadian <i>Phlebitis</i> ya/tidak
							1	2	3	4	5	6	7	8	9	10				
90	2bln/ 4,5kg	L	Pneumonia, DCA dengan dehidrasi sedang, sepsis	Membaik	4 hari	Cefotaxime 50mg/6j	√	√	√	√							3,5	2	CVC	Tidak
						Fenobarbital 12mg/12j	√	√	√	√										
						Ampicillin 450mg/6j			√	√										
						Chloralhidrat 2cc/x	√	√												
						Ketokonazole salep 3 dd ue			√											
						Zink 20g/24j				√										
						Rf 1ml/j	X	X	X	X										
91	15th/ 55kg	L	Edema cerebri, sepsis, anemia, trauma cerebral	Membaik	4 hari	Cetriaxone 50mg/24j	√	√	√	√						4	1	CVC	Tidak	
						Furosemid 10mg/12j	√													
						Ampicillin 450mg/6j	√	√	√	√										
						Omeprazole 40mg/12j			√	√										
						Ranitidin 25mg/8j	√													
						Paracetamol 250mg/Kp		√	√	√										
						Piracetam 750mg/8j	√													
						Rf 50ml/j	X	X												
92	14th/ 45kg	P	Sepsis, AKI, pedikulosis, ISK jamur, DM tipe 1, eritema dan nyeri	Meninggal	3 hari	Paracetamol 250mg/6j	√	√	√						5,666	1	PVC	Ya		
						Cefotaxime 50mg/6j	√	√	√											
						Omeprazole 12mg/x	√	√	√											
						Sucralfat 250mg/8j	√	√	√											
						Furosemid 20mg/8j		√	√											
						Flukonazole 100g/24j			√											
						D5 1/2 N5 88ml/j	X	X	X											
						Morfin 10mcq-1ml/j			X											
						Midazolam 1mcq-2,7ml/j	X		X											
						Rf 1ml/j		X	X											
KCL 33,3ml/j	X	X	X																	
Dobutamin 5mcq-1ml/j	X	X	X																	

No	Usia / BB	JK	Diagnosa	Satatus keluar	LOS	Nama obat dan Nama Cairan IV	Jumlah Obat dan Cairan / Hari										Rata rata Penggunaan Obat Rawat Inap	Rata rata Penggunaan Obat 1 Waktu	Jalur IV	Kejadian Phlebitis ya/tidak	
							1	2	3	4	5	6	7	8	9	10					
93	10th 8bln/ 40kg	L	Syok hipovolemik, AKI, hipertensi std 2, hiponatremia, sepsis	Membaik	4 hari	Metronidazole 7,5/8j	√	√		√								3,75	1	CVC	Tidak
						Ranitidin 25mg/12j	√	√													
						Paracetamol 250mg/6j	√			√											
						Ondansentron 4mg/Kp		√	√												
						KCL 3X500mg		√	√	√											
						NaCl 0,9% -3ml/j	X	X													
						D 12,5% 1ml/j		X	X												
Dopamin 2ml/j		X	X	X																	
94	7th/1 5kg	P	Anemia, asidosis respiratorik, sepsis, perdarahan paru	Meninggal	3 hari	Cefotaxime 50mg/8j	√	√	√								5,666	2	CVC	Tidak	
						Paracetamol 250mg/6j		√	√												
						Furosemid 20mg/8j	√	√	√												
						Sucralfat 250mg/8j	√	√	√												
						Laktulosa syr 5ml/12j	√	√	√												
						Omeprazole 40mg/12j	√	√													
						Rf 52ml/j	X														
						Dopamin 5mcq-2ml/j		X	X												
Ketamin 20mcq-2ml/j			X																		
95	3bln/ 5,5kg	L	Anemia, epilepsi, susp syndrom, laringitis, hipoalbumin, sepsis	Membaik	6 hari	Meropenem 10mg/8j	√	√	√	√	√	√					7,333	2	CVC	Tidak	
						A.s.Valproat 100ml/12j	√	√	√	√	√	√									
						Fenobarbital 12mg/12j	√	√													
						Vankomisin 500mg/6j	√	√	√	√	√	√									
						Azitromicine 15mg/24j	√	√	√	√	√										
						Chloralhidrat 2cc/x	√	√	√	√	√										
						Paracetamol 40mg/6j	√	√	√	√	√	√									
						Vit D 25ug/hr	√	√	√	√	√	√									
						Norepineprin 0,5ml/j	√	√													
						Rf 1ml/j	X	X	X	X	X	X									

البحر الإسلامي للأندلس

No	Usia / BB	JK	Diagnosa	Satatus keluar	LOS	Nama obat dan Nama Cairan IV	Jumlah Obat dan Cairan / Hari										Rata rata Penggunaan Obat Rawat Inap	Rata rata Penggunaan Obat 1 Waktu	Jalur IV	Kejadian <i>Phlebitis</i> ya/tidak			
							1	2	3	4	5	6	7	8	9	10							
96	3th/13kg	P	Gizi buruk, pneumonia, hiponatremia, alkalosis, sepsis	Membaik	7 hari	Azitromicine 15mg/24j	√	√	√	√	√								5,571	2	CVC	Tidak	
						As.Falproat 100ml/12j	√	√	√	√	√	√	√										
						Salbutamol 50g/6j	√	√	√	√	√	√	√										
						Fenobarbital 12mg/12j	√	√	√	√	√	√	√										
						Chloralhidrat 2cc/x	√			√	√	√	√										
						Nebu NaCl 0,9%/8j		√	√	√	√	√	√										
						Paracetamol 160mg/6j							√	√									
						Norepineprin 0,5ml/j	X						X	X									
97	6bln/4,5kg	P	<i>Phlebitis</i> , laringomalaria tipe 2, sepsis, pulmoneri edema, anemia, down syndrom	Membaik	4 hari	Meropenem 500mg/8j	√	√	√	√								7,5	2	PVC	Ya		
						Fluconazole 400mg/24j	√	√	√	√													
						Paracetamol 80mg/8j	√	√	√	√													
						Piracetam 750mg/8j	√	√	√														
						Kloralhidrat 3,5ml/6j	√	√	√														
						Furosemid 20mg/8j	√	√	√	√													
						Zink 20g/24j	√	√	√														
						Sanbaplex 0,2ml/24j	√	√	√														
						Laktulosa syr 5ml/12j	√	√															
						Midazolam 4mcq-1ml/j	X	X	X														
						D5 1/2 5s 1ml/j		X															
						Dopamin 2ml/j	X	X															
98	15th 2bln/60kg	L	Edema cerebri, sepsis, anemia, epilepsi, trauma cerebral	Membaik	3 hari	Cefotaxime 1,1g/6j	√	√	√									4,666	1	CVC	Tidak		
						Ranitidin 25mg/12j	√	√	√														
						Paracetamol 640mg/6j	√	√	√														
						Sukralfat 500mg/6j	√		√														
						Fenobarbital 12mg/12j	√	√	√														
						Midazolam 7,2ml/j	X	X	X														
						Fentanil 2,4ml/j		X	X														
						Morfin 10mcq-1ml/j	X	X															

البحر الاستاذية

No	Usia / BB	JK	Diagnosa	Satatus keluar	LOS	Nama obat dan Nama Cairan IV	Jumlah Obat dan Cairan / Hari										Rata rata Penggunaan Obat Rawat Inap	Rata rata Penggunaan Obat 1 Waktu	Jalur IV	Kejadian <i>Phlebitis</i> ya/tidak	
							1	2	3	4	5	6	7	8	9	10					
99	9th/23kg	P	Tumor, sepsis, hipoalbumin, anemia, gizi buruk	Membaik	3 hari	Cefotaxime 50mg/6j		√	√									3,3	1	CVC	Tidak
						Paracetamol 400mg/6j	√	√	√												
						Ondansentron 4mg/Kp	√	√													
						Vankomisin 500mg/6j		√													
						Rf 3ml/j	X														
						Fentanil 1ml/j		X	X												
100	3th 8bln/16kg	L	Tumor, sepsis, edema celebri, hipoalbumin, hipernatremia	Meninggal	4 hari	Ranitidin 25mg/12j	√	√	√								4,4	3	CVC	Tidak	
						Paracetamol 160mg/6j	√	√	√	√											
						Furosemid 20mg/8j	√	√	√	√											
						D5 1/2 N5 2ml/j	X	X	X	X											
						Rf 3ml/j	X	X													
						Albumin 20%-2ml/j			X	X											
101	12th 5bln/27kg	P	Edema pulmo, sepsis, hipertensi, CKD std 5, hiponatremia, stomatitis	Membaik	6 hari	Omeprazole 40mg/12j	√	√	√	√							8,333	1	CVC	Tidak	
						Fenobarbital 12mg/12j	√			√											
						Cefotaxime 50mg/6j	√	√	√	√											
						Paracetamol 640mg/6j		√	√	√											
						Furosemid 20mg/8j	√	√	√	√	√	√									
						Amlodipin 60mg/24j	√	√	√	√	√	√									
						Spironolakton 60mg/12j	√	√	√	√	√	√									
						Valsartan 40mg/24j	√	√	√	√	√	√									
						Sukralfat 500mg/6j	√	√	√	√											
						Allupurinol 100mg/12j						√									

No	Usia / BB	JK	Diagnosa	Satatus keluar	LOS	Nama obat dan Nama Cairan IV	Jumlah Obat dan Cairan / Hari										Rata rata Penggunaan Obat Rawat Inap	Rata rata Penggunaan Obat 1 Waktu	Jalur IV	Kejadian Phlebitis ya/tidak		
							1	2	3	4	5	6	7	8	9	10						
						Fentanil 1mcq-0,5ml/j	x	x														
						D5 1/2 N5 0,5ml/j		x	x	x	x	x										
						Norepineprin 0,5ml/j					x	x										
102	11th 12bln /12kg	L	Sepsis, anemia,gizi buruk,syok sepsi, AKI	Membaik	5 hari	Cefotaxime 50mg/6j	√	√	√	√	√							6,8	1	CVC	Tidak	
						Metronidazole 50mg/6j	√	√	√	√	√											
						Omeprazole 40mg/12j	√	√	√	√	√											
						Sukralfat 500mg/6j	√	√														
						Ketorolak 20mg/6j	√	√	√	√	√											
						Paracetamol 640mg/6j		√	√	√	√											
						Nebu Nacl 0,9%/8j			√	√	√											
						Zink 20g/24j			√	√	√											
103	3bln/ 8,6kg	P	Anemia, hipokalseia, syok sepsis, henturia maksoskopis , sepsis	Membaik	8 hari	D5 1/2 N5 1ml/j	x	x	x	x	x						2,875	3	CVC	Tidak		
						Cefotaxime 50mg/6j	√	√	√													
						Meropenem 10mg/8j				√	√	√	√	√								
						Paracetamol 40mg/6j	√	√	√	√	√	√	√	√								
						Metronidazole 7,5/8j	√	√	√	√	√	√	√	√								
						Ranitidin 2mg/8j			√	√	√											
						As Amino 10%-3,6ml/j	x	x														
104	9th/1 3kg	P	Diare cair akut, syok sepsis, anemia, hipoalbumin, epilepsi, sepsis	Meninggal	3 hari	TPN 19,3ml/j		x	x	x	x			x			7	1	PVC	Tidak		
						Fentanil 1ml/j			x	x	x	x	x									
						Azitromicine 15mg/24j	√	√	√													
						Paracetamol 400mg/6j	√	√	√													
						As.Falproat 100ml/12j	√	√	√													
						Vit B 5ml/2x1	√															
						Zink 20g/24j	√	√	√													
						Ranitidin 25mg/12j	√	√	√													
						Meropenem 25mg/8j	√	√	√													
						Furosemid 20mg/8j	√	√	√													
						Rf 10ml/j	x															
Ketamin 4ml/j		x	x																			
Fentanil 0,78ml/j			x																			
Norepineprin 0,1ml/j		x																				

No	Usia / BB	JK	Diagnosa	Satatus keluar	LOS	Nama obat dan Nama Cairan IV	Jumlah Obat dan Cairan / Hari										Rata rata Penggunaan Obat Rawat Inap	Rata rata Penggunaan Obat 1 Waktu	Jalur IV	Kejadian <i>Phlebitis</i> ya/tidak		
							1	2	3	4	5	6	7	8	9	10						
105	2th/1 kg	P	<i>Phlebitis</i> , sepsis, epilepsi, ARDS berat, phaces syndrom	Meninggal	5 hari	Ceftriaxone 20mg/24j	√											6,6	2	PVC	Ya	
						Gentamicine 1,7mg/8j	√															
						Kotrimoxazole 240mg/12j	√	√	√	√	√											
						Sukralfat 500mg/6j	√	√	√													
						Azitromicine 15mg/24j		√	√	√	√											
						Meropenem 25mg/8j		√	√	√	√											
						Paracetamol 160mg/6j	√	√	√	√	√											
						KCL 3X500mg		√	√													
						Metilprednisolon 2mg/24j		√	√	√	√											
						Kloralhidrat 3,5ml/6j		√	√	√	√											
						Dopamin 2ml/j	X	X														
						Fentanil 1mcq-0,2ml/j		X	X	X												
						D5 1/4 N5 40m/j		X	X	X	X											
Ketamin 2mcq-2ml/j				X	X																	
106	3th 5bln/15kg	L	Anemia,hipoalbumin, sepsis, ISK, hipokalemia	Membaik	6 hari	Cefotaxime 50mg/6j	√	√	√	√	√	√					5,166	1	CVC	Tidak		
						Metronidazole 40mg/6j	√	√	√	√	√	√										
						Paracetamol 160mg/6j	√	√	√	√	√	√										
						Ranitidin 25mg/12j	√	√	√	√	√	√										
						Ceftriaxone 20mg/24j		√														
						Nebu Nacl 0,9%/8j				√	√	√										
						Zink 20g/24j					√	√										
						Meropenem 25mg/8j					√											
						D 2,5% Na2K1Ca1 5ml/j	X	X	X	X	X	X										
						Midazolam 0,9ml/j				X	X	X										
						Fentanil 0,6ml.j		X	X													
107	5bln/6,2kg	P	Gizi buruk, ISK, penurunan kesadaran tumor, sepsis	Membaik	4 hari	Cefotaxime 50mg/6j	√	√	√	√						6,625	1	CVC	Tidak			
						Fenitoin 100g/12j	√			√												
						As.Falproat 100ml/12j	√	√	√	√												
						Paracetamol 80mg/6j	√	√	√	√												
						OAT 1tab/8j		√	√	√												
Norepineprin 0,5ml/j	X	X	X	X																		

No	Usia / BB	JK	Diagnosa	Statatus keluar	LOS	Nama obat dan Nama Cairan IV	Jumlah Obat dan Cairan / Hari										Rata rata Penggunaan Obat Rawat Inap	Rata rata Penggunaan Obat 1 Waktu	Jalur IV	Kejadian <i>Phlebitis</i> ya/tidak	
							1	2	3	4	5	6	7	8	9	10					
108	1th 6bln/ 5,2kg	P	Gizi buruk, epilepsi, hipokalemia, GOD, stunting duodenum	Membaik	8 hari	Cefotaxime 50mg/6j	√	√	√	√	√	√	√	√				4,25	1	CVC	Tidak
						Metronidazole 40mg/6j	√	√	√	√	√	√	√	√							
						Paracetamol 120mg/6j	√	√	√	√	√	√	√	√							
						As.Falproat 100ml/12j	√	√	√	√	√	√									
						Sanbaplex 0,2ml/24j						√	√	√							
						Zink 20g/24j						√	√	√							
						D10% Na2K2Ca1-9ml/j	X	X	X	X	X	X	X	X							
						KCL 12,5ml/j	X	X	X												
109	3,5bl n/4,4 kg	P	Gizi buruk, mikrosefal, klorangitis, hipoalbumin, siaper rush, sepsis	Membaik	10 hari	Cefotaxime 50mg/6j	√	√	√	√	√	√	√	√	√		6,2	1	CVC	Tidak	
						Metronidazole 40mg/6j	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√					
						Paracetamol 80mg/6j	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√					
						Metilprednisolon 2mg/24j	√						√	√	√	√					
						Ranitidin 2mg/6j	√	√	√	√	√	√	√								
						Ketorolak 20mg/6j	√	√	√	√	√	√	√								
						Furosemid 20mg/6j	√	√													
						Vankomisin 500mg/6j			√	√	√	√	√	√	√	√					
						Meropenem 10mg/8j									√	√					
						D10Na2K1Ca1-1ml/j	X	X	X												
						Flush AL 6ml/j		X		X	X	X	X			X					
						Norepineprin 0,5ml/j		X		X	X		X	X	X						

No	Usia / BB	JK	Diagnosa	Satatus keluar	LOS	Nama obat dan Nama Cairan IV	Jumlah Obat dan Cairan / Hari										Rata rata Penggunaan Obat Rawat Inap	Rata rata Penggunaan Obat 1 Waktu	Jalur IV	Kejadian Phlebitis ya/tidak				
							1	2	3	4	5	6	7	8	9	10								
110	15th/ 34kg	P	Hiperurisemia, sindrom nefrotik, sepsis, hipokalemia, ISK, AKI	Membaik	8 hari	Cefotaxime 50mg/6j	√	√	√	√	√	√	√	√										
						Ranitidin 2mg/6j	√	√	√															
						Furosemid 20mg/6j	√	√	√															
						Paracetamol 640mg/6j	√	√	√	√	√	√	√	√										
						Metronidazole 40mg/6j	√	√		√	√	√	√											
						Ondansentron 4mg/Kp	√	√	√	√	√	√	√	√										
						Omeprazole 40mg/12j			√	√	√	√	√	√										
						Sukralfat 500mg/6j			√	√	√	√	√	√										
						Flukonazole 100g/24j			√						√	√								
						D10% -18,6ml/j	X																	
Dopamin 10mcq-2cc/j		X	X	X	X	X																		
Norepineprin 3cc/j		X	X	X	X	X	X	X	X															
111	2th/7 .5kg	L	Hipotiroid, sepsis, hiperglikemia, hipokalemia, gizi buruk	Meninggal	6 hari	Paracetamol 120mg/6j	√	√	√	√		√												
						Cefotaxime 50mg/6j	√	√	√	√	√	√												
						Diazepam 3,5mg/6j		√	√															
						Chloralhidrat 2cc/x		√	√															
						Vankomisin 500mg/6j					√	√												
						Furosemid 20mg/8j		√																
						KCL 3X500mg							√											
						D5 1/4 N5 30ml/j	X	X	X															
						Midazolam 1,4ml/j			X															
						Fentanil 0,2ml/j		X	X		X	X												
Ketamin 1ml/j		X	X	X																				
112	5th/1 5kg	L	Anemia, sepsis, hiponatremia	Membaik	4 hari	Cefotaxime 50mg/6j	√																	
						Metronidazole 40mg/6j	√	√	√	√														
						Paracetamol 640mg/6j	√	√	√	√														
						Ranitidin 2mg/6j	√	√	√	√														
						Ketorolak 20mg/6j	√	√	√	√														
						Rf 1ml/j	X	X	X	X														
Norepineprin 0,5ml/j	X	X	X	X																				

No	Usia /BB	JK	Diagnosa	Statatus keluar	LOS	Nama obat dan Nama Cairan IV	Jumlah Obat dan Cairan / Hari										Rata rata Penggunaan Obat Rawat Inap	Rata rata Penggunaan Obat 1 Waktu	Jalur IV	Kejadian <i>Phlebitis</i> ya/tidak	
							1	2	3	4	5	6	7	8	9	10					
113	10bln /9kg	L	Epilepsi, syok sepsis, GOD, anemia, sepsis	Membaik	4 hari	Cefotaxime 50mg/6j	√	√	√	√								4,25	2	CVC	Tidak
						Paracetamol 80mg/j	√	√	√	√											
						KCL 3X500mg	√	√	√												
						Fenobarbital 12mg/12j	√	√	√	√											
						Flukonazole 100g/24j	√	√													
						Midazolam 2ml/j	X	X	X	X											
						D 5% N5 10ml/j	X	X	X	X											
Rf 1ml/j	X																				
114	2bln/ 4kg	P	Pneumonia, sepsis, anemia, hiperlabumin	Membaik	5 hari	Meropenem 10mg/8j	√	√	√	√	√						2,4	2	CVC	Tidak	
						Kloralhidrat 3,5ml/6j	√	√													
						Metronidazole 40mg/6j	√	√			√										
						Nebu Adrenalin 0,01mg/2mnt					√										
						D12,5%NaD1Ca1 2ml/j	X	X	X	X											
Rf 1ml/j	X	X			X																
115	7th 10bln /20kg	L	Sepsis, epilepsi, bronkitis, anemia	Membaik	3 hari	Ceftriaxon 20mg/8j	√	√	√								2	1	CVC	Tidak	
						Ranitidin 4mg/8j	√	√													
						Vankomisin 500mg/6j	√														
						Paracetamol 320mg/6j		√													
						Rf 5ml/j	X	X	X												
						Fentanil 0,2nl/j			X												
Midazolam 1,2ml/j		X																			
116	6th/2 4kg	L	Epilepsi, sepsis, hipematremia, anemia	Membaik	3 hari	Meropenem 50mg/6j	√	√	√							5,333	1	CVC	Tidak		
						Metronidazole 40mg/6j	√	√	√												
						Paracetamol 320mg/6j	√	√	√												
						Ranitidin 2mg/6j	√	√													
						Omeprazole 40mg/12j		√	√												
Rf 1ml/j	X	X	X																		

No	Usia / BB	JK	Diagnosa	Satatus keluar	LOS	Nama obat dan Nama Cairan IV	Jumlah Obat dan Cairan / Hari										Rata rata Penggunaan Obat Rawat Inap	Rata rata Penggunaan Obat 1 Waktu	Jalur IV	Kejadian <i>Phlebitis</i> ya/tidak
							1	2	3	4	5	6	7	8	9	10				
117	13th 9bln/ 50kg	L	ISK jamur, hiponatremia, sepsis, edema cerebri, TB	Membaik	8 hari	Meropenem 40mg/8j	√	√	√	√	√	√		√			4.375	2	CVC	Tidak
						KCL 3X500mg	√	√												
						Paracetamol 640mg/6j	√	√	√	√	√	√		√						
						Dexamethasone 4mg/6j		√	√	√	√									
						Fluconazole 12mg/6j		√	√	√	√	√	√	√						
						Ranitidin 2mg/6j		√	√	√	√	√								
						Furosemid 20mg/6j				√	√	√		√						
						Rf 5ml/j	X	X	X	X	X	X	X	X						
						NaCl 0,9% 25ml/j		X	X	X	X	X								
Albumin 20% -5ml/j						X	X													
118	7bln/ 6,8kg	P	Anemia, edema cerebri, hiponatremia, sepsis	Membaik	4 hari	Cefotaxime 50mg/6j	√	√	√	√						5,75	1	CVC	Tidak	
						KCL 3X500mg	√	√	√	√										
						Fenobarbital 12mg/12j	√	√	√	√										
						Omeprazole 40mg/12j	√	√	√											
						NaCl 0,9%/8j			√	√										
						Paracetamol 320mg/6j	√	√	√	√										
						NaCl 9%/8j			√	√										
						Norepineprin 0,5ml/j	X													
Rf 1ml/j		X	X																	

البحر الإسلامي للأندلس

No	Usia / BB	JK	Diagnosa	Satatus keluar	LOS	Nama obat dan Nama Cairan IV	Jumlah Obat dan Cairan / Hari										Rata rata Penggunaan Obat Rawat Inap	Rata rata Penggunaan Obat 1 Waktu	Jalur IV	Kejadian <i>Phlebitis</i> ya/tidak				
							1	2	3	4	5	6	7	8	9	10								
119	1th 8bln/ 9,8ig	L	Anemia, syok sepsis, ulkus peptik, hipokalemia, hiponatremia	Membaik	8 hari	Cefotaxime 50mg/6j	√	√	√										5	1	CVC	Tidak		
						KCL 3X500mg	√	√	√	√	√	√	√											
						Ranitidin 2mg/6j	√	√	√	√	√	√	√	√										
						NaCl 0,9%/8j	√	√																
						Paracetamol 120mg/6j	√	√	√	√	√	√	√	√										
						Meropenem 4]0mg/8j			√	√	√	√	√	√										
						Furosemid 20mg/8j				√				√										
						Sukralfat 500mg/6j								√	√									
						Dexamethasone 4mg/6j										√								
						NaCl 0,9% 25ml/j	X	X	X	X	X	X	X	X										
						Ketamin 10mcq-4ml/j		X	X	X	X	X	X	X										
Norepineprin 0,5ml/j		X	X	X																				
Rf 1ml/j	X				X	X																		
120	2th 10bln /14kg	L	Syok hipovolemik, diare cair akut, sepsis, hipertensi, hipoalbumin, steroid	Membaik	3 hari	Paracetamol 160mg/6j	√	√	√									5	1	CVC	Tidak			
						Prednisolon 2mg/12j	√	√	√															
						Vankomisin 500mg/6j		√	√															
						Ranitidin 2mg/6j		√	√															
						Myforhic 720mg/24j		√	√															
						Lacto B 1sachet/6j		√	√															
						Lisinopril 5mg/24j			√															
						Norepineprin 0,5ml/j	X																	
NaCl 0,9% 2ml/j		X	X																					
121	5bln/ 4kg	P	Syok sepsis, epilepsi, gizi kurang, anemia, hipoalbumin, alkalosis, sepsis	Membaik	7 hari	Cefotaxime 50mg/6j	√	√	√									6,1428	1	CVC	Tidak			
						Fenobarbital 12mg/12j	√	√	√	√		√	√											
						Paracetamol 80mg/6j	√	√	√	√	√		√											
						Meropenem 500mg/8j	√	√	√	√	√	√	√											
						Furosemid 20mg/8j	√	√	√	√	√													
						Azitromicin 250mg/24j			√	√	√	√	√											
						Chloralhidrat 2cc/x			√	√	√													
						Ketorolac 0,5/6j			√	√	√													
						Nebu NaCl 3% 2ml/j					√	√	√											
Metilprednisolon 2mg/24j					√	√																		

No	Usia / BB	JK	Diagnosa	Satatus keluar	LOS	Nama obat dan Nama Cairan IV	Jumlah Obat dan Cairan / Hari										Rata rata Penggunaan Obat Rawat Inap	Rata rata Penggunaan Obat 1 Waktu	Jalur IV	Kejadian <i>Phlebitis</i> ya/tidak
							1	2	3	4	5	6	7	8	9	10				
						Rf 1ml/j	X	X	X	X	X	X								
						Nebu NaCl 3% 2ml/j				X	X	X								
						Fentanil 1mcq-0,16ml/j			X				X							
122	14th/50kg	L	Anemia, sespsis, edema cerebri, hiponatremia	Membaik	4 hari	Ceftriaxon 20mg/8j	√	√	√	√							3,5	1	CVC	Tidak
						As. Manexamat 10mg/8j	√	√												
						Ranitidin 4mg/8j	√	√												
						Ketorolac 0,5/6j	√	√	√	√										
						Fenitoin 100g/12j	√	√		√										
						Omeprazole 40mg/12j	√	√	√	√										
						Furosemid 20mg/8j	√													
						Paracetamol 640mg/6j	√	√	√	√										
						Norepineprin 0,5ml/j	X	X	X	X										
123	1th/5kg	L	Gizi buruk, down syndrome, anemia, hipoalbumin, sepsis	Membaik	5 hari	Paracetamol 120mg/6j	√	√	√	√	√						6,8	2	CVC	Tidak
						Cefotaxime 50mg/6j	√	√	√	√	√									
						Sildenafil 12,5ml/8j	√	√	√	√	√									
						Furosemid 20mg/8j	√	√	√	√	√									
						Aminofillin 8mg/6j	√	√	√	√										
						Chloralhidrat 2cc/x		√												
						Azitromicin 250mg/24j		√	√	√	√									
						NaCl 0,9% 2ml/j			√	√	√									
						KCL 3X500mg					√									
						Meropenem 500mg/8j					√									
						D5 1/4 N5 5ml/j	X	X	X	X	X									
						Midazolam 1mcq-0,3ml/j					X									
						Fentanil 1mcq-0,1ml/j		X	X		X									
						NaCl 0,9% 2ml/j	X	X			X									
						Rf 1ml/j			X	X										

No	Usia / BB	JK	Diagnosa	Satatus keluar	LOS	Nama obat dan Nama Cairan IV	Jumlah Obat dan Cairan / Hari										Rata rata Penggunaan Obat Rawat Inap	Rata rata Penggunaan Obat 1 Waktu	Jalur IV	Kejadian <i>Phlebitis</i> ya/tidak			
							1	2	3	4	5	6	7	8	9	10							
124	3,5bln/4,4kg	L	Gizi kurang, hiperlipidemia, epilepsi, biopsi, hipoalbumin, sepsis	Membaik	6 hari	Cefotaxime 20mg/6j	√	√	√	√	√	√							4	1	CVC	Tidak	
						Metronidazole 40mg/6j	√	√	√	√	√	√											
						Paracetamol 40mg/6j	√	√	√														
						Metilprednisolon 2mg/24j	√																
						Ranitidin 4mg/8j			√	√	√	√											
						Vit K 10mg/hr				√	√												
						Sistenol 1/2kaplet/8j					√	√											
						Midazolam 4mcq-0,78ml/j	X	X	X	X	X	X											
						Fentanil 2mcq-0,16ml/j		X	X														
						Norepineprin 0,5ml/j		X	X		X	X											
Albumin 25%-1cc/j				X	X																		
125	8bln/8kg	L	Dehidrasi ringan, sepsis, anfal, epilepsi, hipoalbumin	Membaik	4 hari	Cefotaxime 20mg/6j	√	√	√	√							5,25	2	PVC	Tidak			
						Metronidazole 40mg/6j	√	√	√	√													
						Paracetamol 80mg/6j	√	√	√	√													
						Ranitidin 4mg/8j	√	√	√	√													
						Nebu Ventoilin 10ml/8j		√	√	√													
						Amikasin 15mg/8j			√	√													
						Fentanil 2mcq-0,4ml/j	X	X	X	X													
						D10%+elektrolit 16cc/j	X	X	X	X													
126	12th 6bln/28kg	L	Epilepsi, sepsis, hipernatremia, gizi kurang	Membaik	7 hari	Cefotaxime 50mg/6j	√	√	√	√	√	√	√			5	1	CVC	Tidak				
						Omeprazole 40mg/12j	√	√	√														
						Fenobarbital 12mg/12j	√	√	√	√	√	√	√										
						As.Falproat 100ml/12j	√	√				√	√										
						Furosemid 20mg/8j	√	√															
						Paracetamol 480mg/6j	√	√	√			√	√										
						Ketorolac 10mg/6j			√	√	√	√											
						Sukralfat 500mg/6j			√			√											
						NaCl 0,9%-2ml/j									√								
Rf 1mcq-1ml/j	X	X	X	X	X	X	X	X															

No	Usia / BB	JK	Diagnosa	Satatus keluar	LOS	Nama obat dan Nama Cairan IV	Jumlah Obat dan Cairan / Hari										Rata rata Penggunaan Obat Rawat Inap	Rata rata Penggunaan Obat 1 Waktu	Jalur IV	Kejadian <i>Phlebitis</i> ya/tidak
							1	2	3	4	5	6	7	8	9	10				
127	3bln/ 6kg	P	Gizi kurang, gangguan fungsi koagulami, sepsis, anemia	Membaik	3 hari	Cefotaxime 20mg/6j	√	√									4,6666	1	CVC	Tidak
						Amikasin 15mg/8j	√													
						Ranitidin 4mg/8j	√	√												
						Ketorolac 10mg/6j	√	√												
						Vit K 10mg/hr	√	√	√											
						Fenobarbital 12mg/12j		√	√											
						Sistenol 1/2kaplet/8j		√	√											
Fentanil 2mcq-0,2ml/j	X	X	X																	
128	6bln/ 6,8kg	P	Anemia, cmv, atresia belien tipe 2, sepsis	Membaik	8 hari	Cefotaxime 20mg/6j	√	√	√	√	√					4,5	3	CVC	Tidak	
						Metronidazole 20mg/6j	√	√	√	√	√	√	√	√						
						Omeprazole 10mg/12j		√	√	√	√	√	√	√						
						Sistenol 70mg/8j		√												
						Paracetamol 80mg/6j		√	√	√	√	√	√	√						
						Furosemid 20mg/8j			√											
						Ketorolac 0,5/6j			√		√	√	√	√						
						Meropenem 4]0mg/8j						√	√							
						Rf 4ml/j	X													
						Epidural 1,8ml/j		X	X	X										
						Flush AL+CVC 6ml/j			X	X			X	X						
AA1% 4,28ml/j				X	X	X	X	X												
129	12th/ 35kg	P	Anemia,ISK,e dema cerebri, sepsis	Membaik	5 hari	Ceftriaxon 1g/12j	√	√	√	√	√				3,4	2	CVC	Tidak		
						Ketorolac 10mg/6j	√	√	√	√	√									
						Furosemid 20mg/8j	√	√	√											
						Paracetamol 350mg/ks tra	√	√	√	√										

No	Usia / BB	JK	Diagnosa	Satus keluar	LOS	Nama obat dan Nama Cairan IV	Jumlah Obat dan Cairan / Hari										Rata rata Penggunaan Obat Rawat Inap	Rata rata Penggunaan Obat 1 Waktu	Jalur IV	Kejadian <i>Phlebitis</i> ya/tidak	
							1	2	3	4	5	6	7	8	9	10					
130	1th 7bln/ 10kg	L	Kista, sepsis, anemia, hipoalbumin, biopsi, epilepsi	Meninggal	4 hari	Metronidazole 75mg/8j	√	√	√									5,755	1	PVC	Tidak
						Ranitidin 10mg/8j	√														
						Paracetamol 10mg/6j	√	√	√	√											
						Vit K 10mg/hr	√	√	√	√											
						Furosemid 20mg/8j	√														
						Meropenem 400mg/8j	√	√	√												
						Sukralfat 500mg/6j	√	√													
						Omeprazole 5mg/12j	√	√													
						Fenobarbital 25mg/12j	√	√	√												
						Rf 17,5ml/j	X	X													
						Norepineprin 0,5ml/j		X													
						Fentanil 1mcq-0,2ml/j		X													
						Midazolam 1mcq-1,2ml/j		X	X												
Epidural 1,8ml/j		X	X																		
Albumin 20% -5ml/j			X																		
131	1th 5bln/ 10kg	P	Sepsis, GIT Bleeding, hipercalsemia, hiperkalsemia	Membaik	3 hari	Meropenem 400mg/8j	√	√	√								8,3333	2	CVC	Tidak	
						Furosemid 20mg/8j	√	√	√												
						Paracetamol 10mg/6j	√	√	√												
						Omeprazole 40mg/12j	√	√	√												
						Sukralfat 500mg/6j	√	√	√												
						Midazolam crem	√	√	√												
						Chloralhidrat 2cc/x	√	√	√												
						Azitromicin 250mg/24j	√	√	√												
						Metilprednisolon 2mg/24j	√														
						Rf 40ml/j	X	X													
						Norepineprin 0,5ml/j			X												
Midazolam 0,4ml/j		X	X																		
Fentanil 0,2ml/j		X	X																		

No	Usia / BB	JK	Diagnosa	Satusat keluar	LOS	Nama obat dan Nama Cairan IV	Jumlah Obat dan Cairan / Hari										Rata rata Penggunaan Obat Rawat Inap	Rata rata Penggunaan Obat 1 Waktu	Jalur IV	Kejadian <i>Phlebitis</i> ya/tidak	
							1	2	3	4	5	6	7	8	9	10					
132	15th/ 90kg	L	Edema pneumonia, sepsis, ISK, stress ulcer, obesitas, hipoalbumin	Meninggal	5 hari	Cefotaxime 50mg/6j	√	√	√	√								5,2	3	CVC	Tidak
						Omeprazole 40mg/12j	√	√	√	√											
						Furosemid 20mg/8j	√	√	√	√	√										
						Paracetamol 640mg/6j	√	√	√	√											
						Sucralfat 250mg/8j	√	√	√	√											
						Fluconazole 400mg/24j		√	√	√											
						Caredilol 12,5mg/12j					√										
						Cac03 500mg/24j					√										
						D5 1/4 N5 25ml/j	X														
						Albumin 25% -5ml/j	X		X	X											
						Midazolam 1mcq-5ml/j	X	X	X		X										
Rf 1ml/j				X	X																
133	11th 1bln/ 33kg	P	Gizi kurang, stress ulcer, hipokalemia, anemia, sepsis	Membaik	4 hari	Cefotaxime 50mg/6j	√	√	√	√							5,75	3	CVC	Tidak	
						Metronidazole 15mg/8j	√	√	√	√											
						Paracetamol 480mg/6j	√	√	√	√											
						Omeprazole 20mg/6j	√	√	√	√											
						Sucralfat 250mg/8j	√	√													
						Ketorolac 10mg/6j	√	√		√											
						Furosemid 20mg/8j			√	√											
						D10Na2K1Ca1 1ml/j	X	X													
						Premix KCL 50mcq-20ml/j		X		X											
						Nutriflex 10ml/j		X	X	X											

البحر الاستاذية

No	Usia / BB	JK	Diagnosa	Statuser keluar	LOS	Nama obat dan Nama Cairan IV	Jumlah Obat dan Cairan / Hari										Rata rata Penggunaan Obat Rawat Inap	Rata rata Penggunaan Obat 1 Waktu	Jalur IV	Kejadian <i>Phlebitis</i> ya/tidak							
							1	2	3	4	5	6	7	8	9	10											
134	11th/46kg	P	Sepsis, ISK, hipoalbumin, anemia, trombositopenia	Membaik	10 hari	Paracetamol 480mg/6j	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√											
						Metronidazole 15mg/8j	√	√	√	√	√	√															
						Sulbactam 150mg/6j	√				√	√															
						Vit K 10mg/hr	√	√	√	√	√																
						Laktulosa 90ml/8j		√	√	√	√							√									
						Omeprazole 20mg/6j		√	√	√								√								√	
						Meropenem 400mg/8j		√	√	√							√									√	
						Furosemid 20mg/8j		√	√	√							√									√	
						Rf 10ml/j	X	X	X																		
						Albumin 25% -5ml/j			X	X	X							X								X	
						Ketamin 10mcq-4ml/j						X	X													X	X
Fentanil 1mcq-0,8ml/j										X	X	X	X	X						X	X						
135	3,5bln/7,4kg	L	Alkalosis, hiponatremia, hipoalbumin, DM, sepsis	Membaik	3 hari	Cefotaxime 50mg/6j		√	√																		
						Paracetamol 40mg/6j	√	√	√																		
						Fenobarbital 5mg/24j	√	√	√																		
						Nebu Adrenalin 0,01mg/2mnt				√																	
						Prednisolon 2mg/12j				√																	
						Rf 25ml/j	X	X																			
136	2th 8bln/11,5kg	P	Edema pulmonaris, hipertensi stage 2, hiperurisemia, hiperkalemia, hipoalbumin	Membaik	3 hari	D5 1/4 N5 17cc/j		X	X																		
						Ceftriaxon 1g/12j	√	√	√																		
						Furosemid 20mg/8j	√	√	√																		
						Nebu Ventoilin 10ml/8j	√	√																			
						Vankomisin 500mg/6j	√	√	√																		
						Bicnat 3g/Kp	√	√	√																		
						Amlodipin 2,5mg/24j	√	√	√																		
						Allupurinol 150mg/8j		√	√																		
Rf 1ml/j	X	X																									
Albumin 20% -2,5ml/j		X	X																								

No	Usia / BB	JK	Diagnosa	Satusat keluar	LOS	Nama obat dan Nama Cairan IV	Jumlah Obat dan Cairan / Hari										Rata rata Penggunaan Obat Rawat Inap	Rata rata Penggunaan Obat 1 Waktu	Jalur IV	Kejadian <i>Phlebitis</i> ya/tidak
							1	2	3	4	5	6	7	8	9	10				
137	7bln/6,8kg	L	Syok sepsis, hipokalsemia, hipoalbumin, sepsis, epilepsi	Membaik	5 hari	Gentamicin 2,5mg/8j	√	√	√	√	√						3,2	1	CVC	Tidak
						Paracetamol 80mg/6j	√	√	√	√	√									
						Metronidazole 15mg/8j	√	√			√									
						Cefotaxime 50mg/6j			√	√	√									
						Rf 1ml/j	X	X	X	X	X									
138	3th 6bln/11kg	L	Cerebritis, sepsis, atrofi, gizi kurang, neumonia	Meninggal	6 hari	Paracetamol 160mg/6j	√	√	√	√	√	√				4,6666	1	CVC	Tidak	
						Cefotaxime 50mg/6j	√	√	√	√	√	√								
						Fenobarbital 25mg/12j	√	√	√	√	√	√								
						Laktulosa 90ml/8j	√	√	√	√										
						Sulbactam 150mg/6j						√								
						Prednisolon 2mg/12j				√	√	√								
						Nebu NaCl 0,9% 2ml/j					√	√								
						Fentanil 2mcq-0,2ml/j	X	X	X			X								
D5 1/4 N5 25ml/j			X	X	X	X														
139	3th 6bln/22kg	P	Obesitas, GIT bleeding, sepsis, ensefalopati, hiponatremia, hipoalbumin	Meninggal	4 hari	Cefotaxime 50mg/6j	√	√	√	√						2,25	1	CVC	Tidak	
						Paracetamol 160mg/6j	√	√	√	√										
						Laktulosa 90ml/8j	√													
						Rf 7,5ml/j	X													
						D5 1/4 N5 17cc/j		X	X	X										
140	7th 5bln/12,5kg	P	ISK kompleks, gizi buruk, anemia, sepsis	Membaik	5 hari	Ceftazidime 3g/h	√	√	√	√	√					4,6	3	CVC	Tidak	
						Metronidazole 15mg/8j	√	√	√	√	√									
						Paracetamol 320mg/6j	√	√	√	√	√									
						Ketorolac 10mg/6j	√	√	√	√										
						Ranitidin 10mg/8j		√	√	√	√									
						Fentanil 2mcq-0,5ml/j	X	X	X	X	X									
						TPN 10% 4,1ml/j			X	X	X									
AA 10% 2,6ml/j		X	X	X	X															

No	Usia / BB	JK	Diagnosa	Satatus keluar	LOS	Nama obat dan Nama Cairan IV	Jumlah Obat dan Cairan / Hari										Rata rata Penggunaan Obat Rawat Inap	Rata rata Penggunaan Obat 1 Waktu	Jalur IV	Kejadian <i>Phlebitis</i> ya/tidak		
							1	2	3	4	5	6	7	8	9	10						
141	5th/17kg	P	Sepsis, diare cair akut, hiponatremia, hipokalemia	Membaik	7 hari	Meropenem 650mg/8j	√	√	√	√	√	√	√						5,2857	3	CVC	Tidak
						Paracetamol 200mg/6j	√	√	√													
						Fenobarbital 50mg/12j	√	√	√	√	√	√	√									
						Metronidazole 15mg/8j	√	√	√	√	√											
						Acyclovir 170mg/8j	√	√	√	√	√	√	√									
						Zink syrup 20mg/24j	√	√	√	√	√	√	√									
						NaCl pulv 2g/8j		√														
						KCL Premix 50cc/j	X	X	X	X	X	X	X									
						NaCl 0,9%-8cc/j		X	X	X				X								
Dopamin 1cc/j					X	X	X															
142	7bln/8,3kg	L	Hipoglikemia, paru, syok hipovolemik, dehidrasi berat, sepsis	Membaik	8 hari	Cefotaxime 400mg/6j	√	√	√	√	√	√		√			2,5	4	CVC	Tidak		
						Maetronidazole 60mg/8j	√	√	√	√				√	√							
						Paracetamol 240mg/6j	√	√	√	√												
						D10Na2K1Ca1 1ml/j	X	X														
						Midazolam 1mcq-0,5ml/j	X	X														
						Fentanil 1mcq-0,17ml/j		X	X	X												
						Premix KCL 50mcq-20ml/j			X	X	X											
AA 10% 3,5ml/j					X	X	X	X														
143	2th 1bln/13kg	L	Pneumonia, alkalosis, GIT bleeding, sepsis, epilepsi	Membaik	5 hari	Ampicillin 650mg/6j	√	√								6	1	CVC	Tidak			
						Gentamicin 80mg/24j	√															
						Ranitidin 15mg/8j	√															

No	Usia / BB	JK	Diagnosa	Satatus keluar	LOS	Nama obat dan Nama Cairan IV	Jumlah Obat dan Cairan / Hari										Rata rata Penggunaan Obat Rawat Inap	Rata rata Penggunaan Obat 1 Waktu	Jalur IV	Kejadian <i>Phlebitis</i> ya/tidak									
							1	2	3	4	5	6	7	8	9	10													
						Paracetamol 130mg/6j	√	√		√																			
						Sucralfat 1,25ml/6j	√	√																					
						Nebu Venitoin 1resp/8j	√	√		√	√																		
						Kloralhidrat 6,25ml/6j	√			√	√																		
						Metilprednisolon 4mg/8j	√	√	√																				
						Cefriaxone 650mg/12j		√	√	√	√																		
						Azitromicin 250mg/24j		√	√	√	√																		
						Zink syrup 20mg/24j			√	√	√																		
						Rf 30,2ml/j	X	X	X	X	X																		
Midazolam 2mcq-1,6ml/j	X	X																											
144	11th/44kg	L	Sepsis, anemia, hipematremia, hipoaalbumin, gizi kurang	Membaik	5 hari	Cefotaxime 2g/6j	√	√	√	√									3,6	2	CVC	Tidak							
						Sucralfat 500mg/6j	√	√	√	√	√																		
						Paracetamol 480mg/6j	√	√	√	√	√																		
						Ranitidin 15mg/8j	√	√	√	√																			
						Rf 1ml/j	X	X	X	X	X																		
145	2th/14kg	L	Epilepsi, nyeri, peradangan vena, sepsis, GIT bleeding, hipoglikemia	Membaik	10 hari	Cefotaxime 700mg/6j	√	√	√	√									6	4	PVC	Ya							
						Paracetamol 140mg/6j	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√								
						Omeprazole 15mg/12j	√	√																					
						Sucralfat 5ml/8j	√	√																					
						Kloralhidrat 6,25ml/6j	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√							
						Dexamethasone 2mg/6j			√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√							
						Vankomisin 500mg/6j				√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√							
						Nebu Nacl 0,9%/8j				√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√							
						Amlodipin 1mg/24j				√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√							
						Chloramfenikol 300mg/6j				√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√							
						Rf 5ml/j	X	X																					
						Midazolam 0,4mcq-5,6ml/j		X	X																				
						Profofol 4,3ml/j				X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X							
Albumin 25% - 1ml/j						X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X													

No	Usia / BB	JK	Diagnosa	Satusat keluar	LOS	Nama obat dan Nama Cairan IV	Jumlah Obat dan Cairan / Hari										Rata rata Penggunaan Obat Rawat Inap	Rata rata Penggunaan Obat 1 Waktu	Jalur IV	Kejadian <i>Phlebitis</i> ya/tidak	
							1	2	3	4	5	6	7	8	9	10					
146	13th 11bln /35kg	P	Sepsis, edema, pneumonia, hipernatremia, epilepsi	Membaik	4 hari	Paracetamol 350mg/6j	√	√	√	√								5,5	1	CVC	Tidak
						Diazepam 10mg/x	√	√	√												
						Furosemid 20mg/x	√	√	√												
						Sukralfat 500mg/6j		√	√	√											
						Dexamethasone 3,5mg/x		√	√												
						Omeprazole 40mg/12j			√	√											
						Ceftazidime 2g/8j			√	√											
						Leukokin 159mcq/24j			√	√											
						Gentamicin 80mg/12j				√											
Rf 30ml/j	X																				
Dopamin 5mcq-1cc/j		X	X	X																	
147	1th 4bln/ 11kg	L	ISK, diare akut, syok sepsis, anemia, pneumonia, sepsis	Membaik	5 hari	Cefotaxime 500mg/6j	√	√	√	√	√						3,8	2	CVC	Tidak	
						Paracetamol 140mg/6j	√	√	√	√	√										
						Metilprednisolon 2mg/24j		√	√	√											
						Omeprazole 40mg/12j		√													
						Ranitidin 15mg/8j		√	√	√											
						Sucralfat 1,25ml/6j			√	√											
						Rf 26ml/j	X	X													
						Midazolam 0,7ml/j		X	X												
Fentanil 2,2ml/j			X	X																	
148	14th/ 39kg	P	ISK, anemia, syok sepsis, hiponatremia, hipokalsemia, sepsis	Membaik	3 hari	Cefotaxime 700mg/6j	√	√	√							4	2	CVC	Tidak		
						Sistenol 400mg/8j	√	√	√												
						Kloralhidrat 6,25ml/6j		√	√												
						Ranitidin 10mg/8j	√														
						Paracetamol 350mg/6j	√	√	√												
						Rf 2ml/j	X	X	X												
Meropenem 1ml/j		X	X																		

No	Usia / BB	JK	Diagnosa	Satatus keluar	LOS	Nama obat dan Nama Cairan IV	Jumlah Obat dan Cairan / Hari										Rata rata Penggunaan Obat Rawat Inap	Rata rata Penggunaan Obat 1 Waktu	Jalur IV	Kejadian <i>Phlebitis</i> ya/tidak
							1	2	3	4	5	6	7	8	9	10				
149	2th 4bln/ 15kg	L	Tumor, sepsis, anemia, hipoalbumin	Membaik	3 hari	Cefotaxime 500mg/6j	√	√	√								6,6666	2	CVC	Tidak
						Metilprednisolon 2mg/24j	√	√	√											
						Fenitoin 100g/12j	√	√	√											
						Ranitidin 15mg/8j	√	√	√											
						Piracetam 2g/6j	√		√											
						Sucralfat 1,25ml/6j	√	√												
						Paracetamol 140mg/6j	√	√	√											
						Metilprednisolon 2mg/24j		√												
						Rf 5ml/j	X													
						Fentanil 0,6ml/j	X	X	X											
Flash AL 3ml/j			X																	
150	7bln/ 5,1kg	L	GIT bleeding, anemia, hiponatremia, sepsis	Meninggal	5 hari	Cefotaxim 50mg/6j	√	√	√	√	√					3,8	1	CVC	Tidak	
						Metronidazole 40mg/6j	√	√	√	√	√									
						Paracetamol 80mg/6j		√	√	√	√									
						Ketorolac 20mg/6j		√	√											
						Kloralhidrat 6,25ml/6j			√	√	√									
						Rf 11ml/j	X													
						Midazolam 1ml/j		X	X	X	X									
						Fentanil 0,2ml/j			X	X	X									
151	3bln/ 5,6kg	P	Hipoalbumin, edema laring, asidosis metabolik, klorongitis, sepsis	Meninggal	7 hari	Cefotaxim 50mg/6j	√	√	√	√	√	√			4,5714	1	CVC	Tidak		
						Metronidazole 40mg/6j	√	√	√	√	√	√	√							
						Paracetamol 80mg/6j	√	√	√	√	√	√	√							
						Metilprednisolon 2mg/24j		√	√				√							

No	Usia / BB	JK	Diagnosa	Satatus keluar	LOS	Nama obat dan Nama Cairan IV	Jumlah Obat dan Cairan / Hari										Rata rata Penggunaan Obat Rawat Inap	Rata rata Penggunaan Obat 1 Waktu	Jalur IV	Kejadian <i>Phlebitis</i> ya/tidak				
							1	2	3	4	5	6	7	8	9	10								
						Nebu Epinefrin 0,01mg/3mnt		√	√															
						Vankomisin 500mg/6j					√	√	√											
						Sanbeplex 0,6ml/hr					√	√	√											
						Ondansentron 0,15mg/8j					√	√	√											
						Vit K 10mg/hr										√								
						Meropenem 40mg/8j										√								
						Ranitidin 4mg/8j										√								
						Midazolam 1mcq-0,6ml/j					X	X	X											
						Fentanil 1mcq-0,1ml/j						X	X	X	X	X								
						Albumin 25%-1ML/J								X	X	X	X							
						Rf 1ml/j										X	X							
152	2th 9bIn/ 8,5kg	L	Sepsis, pneumonia, cerebral polly, TB,gizi buruk	Membaik	3 hari	Meropenem 10mg/8j	√	√	√									6,6666	1	CVC	Tidak			
						Paracetamol 160mg/6j	√	√	√															
						As.Folat 0,3mg/24j	√	√	√															
						Zink syrup 20mg/24j	√	√	√															
						KCL 3X500mg	√																	
						Kloralhidrat 6,25ml/6j	√	√																
						Metilprednisolon 2mg/24j		√																
						Sanbeplex 0,6ml/hr		√	√															
						Lacta B 1sachet/6j		√	√															
						Rf 1ml/j	X																	
						Dobutamin 5mcq-1ml/j		X	X															
Fentanil 1mcq-0,2ml/j			X																					
PRC 18,7ml/j		X	X																					
153	3th 7bIn/ 11kg	P	Gizi buruk, anemia, hipoalbumin, hipokalemia	Membaik	5 hari	Cefotaxim 70mg/6j	√	√	√	√	√						3,8	4	CVC	Tidak				
						Metronidazole 15mg/8j	√	√	√	√	√	√												
						Paracetamol 160mg/6j	√	√	√	√	√	√												
						Ranitidin 15mg/8j	√	√	√	√														
						D10% Na2K1Ca1 32ml/j	X																	
						Albumin 20%-2,5ml/j		X	X															
						AA 10% 4,5ml/j			X															
KCL 50mcq-20ml/j				X	X																			

No	Usia / BB	JK	Diagnosa	Satatus keluar	LOS	Nama obat dan Nama Cairan IV	Jumlah Obat dan Cairan / Hari										Rata rata Penggunaan Obat Rawat Inap	Rata rata Penggunaan Obat 1 Waktu	Jalur IV	Kejadian <i>Phlebitis</i> ya/tidak				
							1	2	3	4	5	6	7	8	9	10								
154	7bln/ 5,7kg	L	Pneumonia bilateral, GIT bleeding, sepsis, trombositopenia, hipokalemia	Membaik	8 hari	Cefotaxim 50mg/6j	√	√	√	√	√	√	√	√										
						Dexamethason 0,6mg/24j	√	√	√	√														
						Metronidazole 15mg/8j	√	√	√	√														
						Captopril 2,5mg/6j	√	√	√	√														
						Spirolakton 3mg/8j	√	√	√	√														
						Furosemid 20mg/8j	√	√	√	√	√	√	√	√	√									
						Fenobarbital 100mg/24j	√	√	√	√	√	√												
						Paracetamol 80mg/6j	√	√	√	√	√	√				√	√							
						Ranitidin 4mg/8j	√	√	√									√	√					
						Sucralfat 1,25ml/6j	√	√	√															
						Nebu Nacl 3%/8j		√	√	√	√													
						Kloralhidrat 6,25ml/6j				√	√	√	√	√	√									
						Myloz 2,5mg/3mnt					√	√	√	√										
						Rf 5ml/j	X	X	X															
Fentanil 1mcq-0,11ml/j		X	X	X	X	X																		
Midazolam 1mcq-0,34ml/j					X	X	X	X																
155	10bln/ 11kg	L	Gizi buruk, hiponatremia, hipokalemia, sepsis	Membaik	5 hari	Cefotaxim 50mg/6j	√	√	√	√														
						Metronidazole 15mg/8j	√	√	√	√														
						Paracetamol 80mg/6j	√	√	√	√	√													
						D10Na2K1Ca1 1ml/j	X	X																
						Albumin 25% 1ml/j		X	X	X														
						AA 10% 4,5ml/j					X	X												
Rf 1ml/j					X	X																		
156	5bln/ 4,1kg	P	Epilepsi, sepsis, pneumonia, anemia, levokolosis	Membaik	3 hari	Cefotaxim 50mg/6j	√	√	√															
						Azitromicin 250mg/24j	√	√	√															
						Nebu Venitoin Iresp/8j	√	√	√															
						Nebu NaCl 0,9%/8j	√																	
						Fenobarbital 100mg/24j				√														
						Fenitoin 100g/6j		√	√															
						Rf 1ml/j	X	X	X															
Fentanil 1mcq-1ml/j				X																				

No	Usia / BB	JK	Diagnosa	Satatus keluar	LOS	Nama obat dan Nama Cairan IV	Jumlah Obat dan Cairan / Hari										Rata rata Penggunaan Obat Rawat Inap	Rata rata Penggunaan Obat 1 Waktu	Jalur IV	Kejadian <i>Phlebitis</i> ya/tidak	
							1	2	3	4	5	6	7	8	9	10					
157	5bln/ 3,3kg	P	Hipoglikemia, CMV, down syndrome, gizi kurang, sepsis, peradangan vena dan eritema	Membaik	10 hari	Meropenem 10mg/8j	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	7,8	1	PVC	Ya
						As.Ursodeoxycholic 250mg/8j	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√				
						Sistenol 400mg/8j	√	√													
						Kloralhidrat 6,25ml/8j	√	√		√	√	√	√	√	√	√	√				
						Sukralfat 250mg/6j	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√				
						Calcitrio 10,01mcq/hr	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√				
						Zink syrup 20mg/24j	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√				
						As.Folat 0,3mg/24j	√	√		√	√	√	√	√	√	√	√				
						Sanbplex 0,6ml/hr				√	√	√									
						Nebu NaCl 0,9%/8j						√		√							
						Paracetamol 80mg/6j						√	√				√				
						D12,5 Na2K1Ca1 1ml/j	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X				
						Midazolam 0,42ml/j						X	X	X	X	X	X				
						Fentanil 1mcq-0,14ml/j			X	X	X										
Dobutamin 2,5ml/j		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X										
NaCl 0,9% 1ml/j								X	X	X	X										
158	7th 9bln/ 25kg	L	Epilepsi, sepsis, edema cerebri, anemia	Membaik	7 hari	Manitol 12cc/j	√	√	√	√	√	√	√				3,8571	1	CVC	Tidak	
						Diazepam 7,5mg/Kp	√	√	√	√	√	√									
						Nebu NaCl 0,9%/8j	√	√	√	√	√	√	√								
						Ceftriaxon 1g/12j			√												
						Paracetamol 250mg/x			√												
						Cefotaxime 1g/6j			√	√	√	√	√								
						Midazolam 1mcq-1,5ml/j	X	X	X												
						Fentanil 1mcq-0,5ml/j			X	X	X										
Rf 5ml/j			X	X	X	X															
159	9th 8bln/ 19kg	P	Ketoasidosis diabetikum, syok hipovolemik, asidosis metabolik berat, gizi buruk, sepsis	Membaik	4 hari	Cefotaxime 1g/8j	√	√	√							4	1	CVC	Tidak		
						Furosemid 20mg/x	√														
						Ranitidin 20mg/12j	√	√	√	√											
						Sukralfat 250mg/6j		√	√	√											
						Meropenem 40mg/8j			√	√											
						Paracetamol 10mg/Kp			√	√											
Hidrokortison 48mg/30mnt				√																	

No	Usia / BB	JK	Diagnosa	Satatus keluar	LOS	Nama obat dan Nama Cairan IV	Jumlah Obat dan Cairan / Hari										Rata rata Penggunaan Obat Rawat Inap	Rata rata Penggunaan Obat 1 Waktu	Jalur IV	Kejadian <i>Phlebitis</i> ya/tidak					
							1	2	3	4	5	6	7	8	9	10									
						Ketamin 10mcq-4ml/j	X	X	X																
						D5 1/2 N5 91ml/j		X	X																
						Rf 5ml/j		X		X															
						Insulin 1,9ml/j		X	X	X															
160	4bln/5,8kg	P	ISK, anemia, hiponatremia, sepsis	Membaik	3 hari	Metilprednisolon 42mg/hr	√	√	√									2,3333	1	CVC	Tidak				
						Furosemid 3mg/24j	√	√	√																
						Rf 1ml/j	X	X	X																
						PRC 15cc/j		X	X																
161	1th/5,2kg	P	Gizi buruk, down syndrome, anemia, hipoalbumin, sepsis	Membaik	5 hari	Ceftriaxone 275mg/12j	√											5,8	1	CVC	Tidak				
						Furosemid 3mg/8j	√	√	√	√	√														
						Captopril 2,5mg/6j	√	√		√	√														
						Kloralhidrat 0,6cc	√	√	√																
						Ranitidin 20mg/12j	√	√	√	√															
						Paracetamol 60mg/Kp	√	√	√	√															
						KCL 3X500mg		√	√	√	√														
						Ceflazidime 260mg/6j		√	√	√	√														
						Midazolam 3mcq-0,6cc/j	X	X	X	X	X														
						D5 1/2 N5 91ml/j				X	X														
						Fentanil 1mcq-0,11ml/j		X	X																
NaCl 0,9% 1ml/j		X	X		X																				
162	1bln 25hr/3,3kg	P	Hipokalemia, hiponatremia, anemia, gizi buruk, epilepsi, sepsis	Membaik	4 hari	Cefotaxime 160mg/8j	√	√	√	√								1,75	3	CVC	Tidak				
						paracetamol 40mg/8j		√	√	√															
						Midazolam 1mcq-0,2ml/j	X																		
						Fentanil 1mcq-0,06ml/j		X	X																
						KCL 0,5mcq-16ml/j			X	X															

No	Usia / BB	JK	Diagnosa	Satusat keluar	LOS	Nama obat dan Nama Cairan IV	Jumlah Obat dan Cairan / Hari										Rata rata Penggunaan Obat Rawat Inap	Rata rata Penggunaan Obat 1 Waktu	Jalur IV	Kejadian <i>Phlebitis</i> ya/tidak
							1	2	3	4	5	6	7	8	9	10				
163	7th/13kg	P	Syok kardiogenik,ISK, gizi buruk,sepsis	Membaik	6 hari	Furosemid 15mg/12j	√										2,3333	1	CVC	Tidak
						Ceftriaxone 275mg/12j	√	√	√											
						Spirolakton 3mg/8j	√	√												
						Furosemid 3mg/24j		√	√	√	√									
						Diazepam 1,5mg/8j		√												
						Zink syrup 20mg/24j			√	√	√									
						Norepineprin 0,5ml/j	X													
						Dobutamin 2,5ml/j		X	X	X										
Dopamin 10m/j			X	X																
Rf 1ml/j			X	X	X															
164	3th/5kg	P	Kista, sepsis, anemia, hiponatremia, edema	Membaik	3 hari	Cefotaxime 600mg/12j	√	√	√							4	2	CVC	Tidak	
						Metronidazole 180mg/x	√	√	√											
						Paracetamol 120mg/6j	√	√	√											
						Nebu Venitoin Iresp/8j	√	√												
						Metilprednisolon 60mg/8j			√											
						Midazolam 1,4ml/j	X													
						Fentanil 0,5ml/j		X	X											
Rf 5ml/j		X	X																	
165	11th 4bln/30kg	P	Epilepsi, hemosiderosis, stres ulcer, sepsis	Membaik	5 hari	Fenobarbital 600mg/8j	√	√	√	√	√					3,2	1	CVC	Tidak	
						Sukralfat 50mg/8j	√	√												
						Omeprazole 20mg/12j	√			√	√									
						Furosemid 0,3mg/x	√	√												
						Manitol 12cc/j		√	√	√	√									
						Rf 10ml/j	X													
Midazolam 1mcq-1,8ml/j		X	X	X																

No	Usia / BB	JK	Diagnosa	Satatus keluar	LOS	Nama obat dan Nama Cairan IV	Jumlah Obat dan Cairan / Hari										Rata rata Penggunaan Obat Rawat Inap	Rata rata Penggunaan Obat 1 Waktu	Jalur IV	Kejadian <i>Phlebitis</i> ya/tidak			
							1	2	3	4	5	6	7	8	9	10							
166	6th 9bln/ 13kg	P	Sepsis,asidosis metabolik berat,SJS,AKI,anemia	Membaik	6 hari	Cefotaxime 650mg/8j	√	√	√	√	√	√							4	2	CVC	Tidak	
						Furosemid 25mg/8j	√	√															
						Omeprazole 1g/12j	√	√	√	√	√	√											
						metilprednisolon 3mg/hr	√	√	√	√	√	√											
						Sucralfat 500mg/6j	√																
						Natriumcarbonat 300mg/8j		√	√	√													
						Midazolam 3mcq-0,60ml/j	X	X	X	X	X	X											
						Fentanil 2mcq-0,52ml/j		X		X	X												
						Albumin 25% 2,5ml/j		X	X	X		X											
Rf 10ml/j																							
167	3bln/ 5,8kg	L	Sepsis, hiponatremia, diare cair akut, AKI, hiponatremia, aritema	Membaik	5 hari	Cefotaxime 50mg/6j	√	√	√	√	√							4,6	3	PVC	Tidak		
						Metronidazole 15mg/8j	√	√	√	√	√												
						Paracetamol 40mg/6j	√	√	√	√	√												
						Cinolon 0,25mg/8j				√	√	√											
						Premix KCL 50mcq-20ml/j	X	X	X	X	X												
						TPN 15,1ml/j				X	X	X											
Rf 1ml/j		X	X																				
168	5bln/ 6,3kg	P	<i>Phlebitis</i> , anemia, asidosis metabolik, hipokalemia	Membaik	8 hari	Nebu Venitoin Iresp/8j	√	√				√	√	√				3,75	2	PVC	Ya		
						Kloralhidrat 0,2ml/8j	√	√	√	√	√												
						Vankomisin 500mg/6j		√	√	√													
						Cefotaxime 300mg/8j		√	√	√	√	√											
						Furosemid 6mg/8j				√	√	√											
						MP 2mg/8j					√	√	√										
						Zink 1x20mg									√	√							
						Paracetamol 70mg/Kp									√	√							
						Ketamin 10mcq-4ml/j	X	X	X	X	X	X	X	X									
						Fentanil 1mcq-0,1ml/j						X	X	X									
Rf 10ml/j				X	X	X	X																

No	Usia / BB	JK	Diagnosa	Satusat keluar	LOS	Nama obat dan Nama Cairan IV	Jumlah Obat dan Cairan / Hari										Rata rata Penggunaan Obat Rawat Inap	Rata rata Penggunaan Obat 1 Waktu	Jalur IV	Kejadian <i>Phlebitis</i> ya/tidak
							1	2	3	4	5	6	7	8	9	10				
169	1th 1bln/ 6,5kg	P	Gizi kurang, hiperlipidemia, biopsi, hipoalbumin, sepsis	Membaik	10 hari	Cefotaxim 350mg/6j	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	2,8	1	CVC	Tidak
						Paracetamol 65mg/Kp	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√				
						Ranitidin 10mg/12j							√	√	√					
						Nebu Nacl 0,9%/8j							√	√	√					
						Sucralfat 250mg/8j									√					
						Furosemid 6mg/8j									√					
						Midazolam 1mcq-0,72ml/j	X													
						Fentanil 1mcq-0,12ml/j		X	X	X			X	X	X					
170	7th 2bln	L	Epilepsi, gizi buruk, sepsis, hipertensi stadium 1, hipokalemia, hipoalbumin	Membaik	5 hari	Cefotaxime 700mg/8j	√	√	√	√	√					6,8	1	CVC	Tidak	
						Metronidazole 7,1mg/8j	√	√	√	√	√									
						Paracetamol 150mg/6j	√	√	√	√	√									
						Ducolax 2x1/2	√	√	√											
						Captopril 2,5mg/6j					√									
						Omeprazole 15mg/12j	√	√	√	√										
						Sucralfat 250mg/8j	√	√	√											
						Metilprednisolon 15mg/8j	√													
						Nebu Adrenalin 0,01mg/2mnt	√													
						Kloralhidrat 0,2ml/8j			√	√	√									
						Diazepam 0,1mg/8j			√	√	√									
						D5 1/4 N5 39ml/j	X	X												
						Midazolam 1mcq-2ml/j		X	X											
						Fentanil 3mcq-0,84ml/j		X	X	X	X									

البحر الإسلامي للأندلس

No	Usia / BB	JK	Diagnosa	Satatus keluar	LOS	Nama obat dan Nama Cairan IV	Jumlah Obat dan Cairan / Hari										Rata rata Penggunaan Obat Rawat Inap	Rata rata Penggunaan Obat 1 Waktu	Jalur IV	Kejadian <i>Phlebitis</i> ya/tidak	
							1	2	3	4	5	6	7	8	9	10					
171	15 th 56ln/ 54kg	P	Gastritis, hipoalbumin, epilepsi, trombositopenia, sepsis, pneumonia	Meninggal	3 hari	Fenitoin 135mg/12j	√	√	√									8,666	1	CVC	Tidak
						Lisinopril 5mg/24j	√	√	√												
						Valsartan 40mg/24j	√	√	√												
						MMF 500mg/12j	√	√	√												
						Metilprednisolon 16mg/8j	√	√	√												
						Cefotaxime 2g/6j	√	√	√												
						Sucralfat 1g/6j	√														
						Furosemid 1mg/8j	√	√	√												
						Sistenol 400mg/8j	√	√	√												
						Dexamethason 5mg		√													
						RL 20ml/j	X														
						Midazolam 1mcq-3,2cc/j		X	X												
						AA 10% 4,5ml/j		X	X												
172	8th/3 4kg	P	Epilepsi, sepsis, CMV disease, GIT bleeding	Membaik	5 hari	Fenobarbital 85mg/12j	√	√	√	√	√						7,8	2	CVC	Tidak	
						As.Valproat 12ml/12j	√	√	√	√	√										
						Haloperidol 0,5mg/8j	√	√	√	√	√										
						Trihexyphenidil 0,7mg/8j	√	√	√	√	√										
						Vit B 50mg/8j	√	√	√	√	√										
						Omeprazole 15mg/12j	√	√	√												
						Sucralfat 250mg/8j	√														
						Paracetamol 500mg/6j		√	√	√	√										
						Cetrixone 50mg/12j		√	√	√	√										
						Zink 20mg/hr				√	√										
Rf 10ml/j	X	X	X	X	X																

No	Usia / BB	JK	Diagnosa	Satatus keluar	LOS	Nama obat dan Nama Cairan IV	Jumlah Obat dan Cairan / Hari										Rata rata Penggunaan Obat Rawat Inap	Rata rata Penggunaan Obat 1 Waktu	Jalur IV	Kejadian <i>Phlebitis</i> ya/tidak		
							1	2	3	4	5	6	7	8	9	10						
173	14th 4bln/ 35kg	P	Cidera kepala berat, syok sepsis, sepsis, pneumonia, edema cerebri, anemia	Membaik	5 hari	Cefotaxime 1g/12j	√	√	√	√								4,8	1	CVC	Tidak	
						Paracetamol 500mg/6j	√		√		√											
						Ranitidin 25mg/8j	√															
						Lisinopril 5mg/24j	√	√	√		√											
						As. Tranexamat 500mg/8j	√	√	√	√	√											
						Vit B 50mg/8j	√	√	√	√												
						Furosemid	√		√	√												
Rf 10ml/j	X	X	X	X	X																	
174	9bln/ 8,5kg	L	Diare cair akut, pneumonia, anemia, sepsis	Membaik	5 hari	Cefotaxime 450mg/6j	√	√									3,6	1	CVC	Tidak		
						Paracetamol 10mg/Kp	√	√	√	√	√											
						Zink 20mg/24j	√	√	√	√	√											
						Vit B 50mg/8j		√	√	√	√											
						Ceftriaxone 275mg/12j			√													
						Dexamethason 5mg/12j			√													
						Rf 5,6ml/j	X	X														
						PRC 22,5ml/j		X	X	X	X											
						Albumin 25% 1ml/j				X	X											
Rf 10ml/j		X	X																			
175	10bln /7,5kg	L	Sepsis, anemia, hipoalbumin, ulkus debecubitus	Membaik	6 hari	Meropenem 300mg/8j	√										4,1666	1	CVC	Tidak		
						Fluconazole 400mg/24j	√	√														
						Azitromicin 250mg/24j	√	√														
						Fenobarbital 60mg/8j	√	√		√	√	√										
						As. Valproat 12ml/12j	√	√	√													
						THP 1x0,6mg	√	√	√	√	√	√										
						Metilprednisolon 7,5mg/8j	√	√	√													
						Paracetamol 80mg/Kp				√												
						Leviziracetam 42mg/12j						√	√									
						Rf 2cc/j	X	X	X	X	X	X										
AA 10% 4,5ml/j			X	X	X	X																

No	Usia / BB	JK	Diagnosa	Satatus keluar	LOS	Nama obat dan Nama Cairan IV	Jumlah Obat dan Cairan / Hari										Rata rata Penggunaan Obat Rawat Inap	Rata rata Penggunaan Obat 1 Waktu	Jalur IV	Kejadian <i>Phlebitis</i> ya/tidak	
							1	2	3	4	5	6	7	8	9	10					
176	16th 1bln/ 57kg	L	Sepsis, trombositopenia, hipoalbumin, hipertensi, pneumonia, anemia	Membaik	3 hari	Cefotaxime 1g/12j	√	√	√									4,6666	2	CVC	Tidak
						Gentamicin 2,5mg/8j	√	√	√												
						Ketorolac 20mg/6j	√	√	√												
						Ranitidin 25mg/8j	√	√	√												
						Dexamethasone 1,5mg/6j		√													
						Paracetamol 500mg/6j			√												
						Sukralfat 1g/6j			√												
						Rf 1ml/j	X														
						Fentanil 1ml/j		X	X												
Midazolam 1mcq-3,1ml/j			X																		
177	8th 11bln /3,4kg	P	Pendarahan konjungtiva, efusi pleura, syok syndrom, upper GIT bledding, sepsis	Membaik	5 hari	Paracetamol 500mg/6j	√	√	√	√	√						3	1	CVC	Tidak	
						Sukralfat 1g/6j	√	√	√												
						Omeprazole 5mg/12j	√	√	√	√	√										
						Furosemid 2mg/12j		√	√												
						Dobutamin 10mcq-2ml/j	X	X	X	X	X										
						Rf 10,2ml/j				X	X										
178	5th 6bln/ 18kg	P	Sepsis ,AKI, ISK, CAP, pneumonia, diare cair akut	Membaik	5 hari	Cefotaxime 1g/12j	√	√									5,4	2	CVC	Tidak	
						Metronidazole 15mg/8j	√	√	√	√	√										
						Fluconazole 400mg/24j	√	√	√	√	√										
						Ranitidin 25mg/8j	√	√	√	√	√										
						Furosemid 20mg/6j		√	√	√	√										
						Paracetamol 500mg/6j		√	√	√	√										
						Meropenem 10mg/8j			√	√	√										
						Rf 8cc/j	X	X	X	X	X										
Fentanil 1/2mcq-0,36ml/j			X	X	X																
Albumin 20%-4,2ml/j		X	X																		

No	Usia / BB	JK	Diagnosa	Satatus keluar	LOS	Nama obat dan Nama Cairan IV	Jumlah Obat dan Cairan / Hari										Rata rata Penggunaan Obat Rawat Inap	Rata rata Penggunaan Obat 1 Waktu	Jalur IV	Kejadian <i>Phlebitis</i> ya/tidak
							1	2	3	4	5	6	7	8	9	10				
179	8bln/8kg	L	Hipertensi, sepsis, anemia, hipoglikemia	Membaik	3 hari	Metilprednisolon 7,5mg/8j	√	√	√								5,3333	1	CVC	Tidak
						Ceftriaxone 275mg/12j	√	√	√											
						Zink 20mg/24j	√	√	√											
						Nebu Venitoin Iresp/8j	√	√	√											
						Bisoprolol 5mg/8j	√	√	√											
						Paracetamol 80mg/6j	√													
						Rf 5cc/j	X	X	X											
AA10% 4,5ml/j			X																	
180	11th 4bln/11kg	L	Gizi buruk, sepsis, ulkus gaster, duodenitis	Membaik	4 hari	Omeprazole 5mg/12j	√	√	√	√						5,25	1	CVC	Tidak	
						Sukralfat 1g/6j	√	√	√	√										
						As.Valproat 12ml/12j		√	√	√										
						Zamel 7,5ml/24j		√	√	√										
						Zink 20mg/24j		√	√	√										
						Osteocal 1tab/hr		√	√	√										
						Metilprednisolon 2mg/24j			√											
						Rf 10ml/j	X	X	X	X										
Fentanil 0,44ml/j	X	X	X	X																
181	6th 11bln/14kg	P	Hiponatremia, sepsis, anemia, hipokalemia, hiperalbumin	Membaik	6 hari	Cefotaxime 1g/12j	√	√	√	√	√	√				4	1	CVC	Tidak	
						Ketorolac 20mg/6j	√													
						KCL 3X500mg	√	√	√			√								
						Furosemid 2mg/12j	√			√	√	√								
						Omeprazole 5mg/12j	√	√												
						Sukralfat 1g/6j	√													
						Paracetamol 320mg/6j	√		√	√										
						Zink 20mg/24j				√	√	√								
						D5% 68ml/j	X	X	X	X	X	X								
						Plasbumin 5% -500ml/j				X	X	X								
Premix KCL 70ml/j		X	X																	

No	Usia / BB	JK	Diagnosa	Satatus keluar	LOS	Nama obat dan Nama Cairan IV	Jumlah Obat dan Cairan / Hari										Rata rata Penggunaan Obat Rawat Inap	Rata rata Penggunaan Obat 1 Waktu	Jalur IV	Kejadian <i>Phlebitis</i> ya/tidak			
							1	2	3	4	5	6	7	8	9	10							
182	13th 3bln/ 55kg	L	Anemia, sepsis, asidosis metabolik, hipoalbumin, syndrom nefrotik	Membaik	6 hari	Ceftriaxone 275mg/12j	√	√	√	√								6,3333	2	CVC	Tidak		
						Metilprednisolon 7,5mg/8j	√	√	√	√	√	√											
						Amlodipin 2,5mg/24j	√	√	√	√	√	√											
						CaCo3	√	√	√	√	√	√											
						Calcitriol 0,01mcq/hr	√	√	√	√	√	√											
						MP 2mg/8j	√	√	√	√	√												
						Furosemid 2mg/12j	√	√															
						Paracetamol 640mg/6j						√	√										
						Omeprazole 5mg/12j							√										
						Rf 16ml/j	X	X	X														
Fentanil 1mcq-1,1ml/j		X	X					X															
PRC 62,5ml/j			X	X	X	X																	
183	2bln/ 3kg	P	Kista, sepsis, edema, gizi kurang, anemia	Membaik	3 hari	Ceftriaxone 125mg/8j	√	√									3,3	1	CVC	Tidak			
						Kloralhidrat 0,2ml/8j	√	√															
						Paracetamol 40mg/6j	√	√	√														
						Zamel 7,5ml/24j		√	√														
						As. Valproat 12ml/12j			√														
						Cefixime 2,5mg/hr			√														
D5 1/4 N5 39ml/j	X	X	X																				
184	3th/1 5kg	P	Trombositopenia, hipoalbumin, hipertensi, anemia, sepsis	Membaik	8 hari	Cefotaxime 1g/12j	√	√	√	√	√	√	√	√			4,6255	1	CVC	Tidak			
						Manitol 12cc/j	√	√	√	√	√	√	√										
						Paracetamol 160mg/6j	√	√		√		√		√									
						Ranitidin 25mg/8j	√	√		√	√	√											
						Fenobarbital 600mg/8j	√	√	√	√	√	√	√	√									
						Furosemid 2mg/12j	√						√										
						Sukralfat 1g/6j			√														
						Metilprednisolon 7,5mg/8j							√										
						D5 1/2 N5 5ml/j	X	X	X	X	X	X	X	X									
Transfusi PRC 12,5ml/j					X	X	X	X															
Fentanil 0,3ml/j				X	X																		

No	Usia / BB	JK	Diagnosa	Satatus keluar	LOS	Nama obat dan Nama Cairan IV	Jumlah Obat dan Cairan / Hari										Rata rata Penggunaan Obat Rawat Inap	Rata rata Penggunaan Obat 1 Waktu	Jalur IV	Kejadian <i>Phlebitis</i> ya/tidak	
							1	2	3	4	5	6	7	8	9	10					
185	9bln/ 7,5kg	P	Hipokalemia, hiponatremia, anemia, gizi buruk, sepsis	Membaik	5 hari	Cefotaxime 1g/12j	√	√	√	√	√							4,4	2	CVC	Tidak
						Metronidazole 7,1mg/8j	√	√	√	√	√										
						Paracetamol 80mg/6j	√	√	√	√	√										
						Ranitidin 25mg/8j	√	√	√	√	√										
						Furosemid 2mg/12j			√		√										
						TPN 10ml/j	X	X	X	X	X										
						AA 10% 4,5ml/j			X	X	X										
						Ketamin 2ml/j		X	X												
						Fentanil 0,2ml/j	X	X													
Albumin 25% 5ml/j	X			X	X																
186	2th/9 kg	L	Diare cair akut, pneumonia, anemia, sepsis	Meninggal	7 hari	Ceftriaxone 275mg/12j	√	√	√	√	√	√	√				2,14285	3	CVC	Tidak	
						Paracetamol 10mg/6j			√	√	√	√	√								
						Nebu NaCl 0,9%/8j					√	√	√								
						D5 1/2 N5 1ml/j	X	X	X	X	X	X	X								
						Fentanil 3mcq-0,84ml/j		X	X	X	X	X	X								
						Midazolam 1mcq-0,55ml/j		X	X	X											
						Albumin 25% 3ml/j				X	X		X								
187	1th/7 kg	P	Epilepsi, anemia, pneumonia, hiponatremia, sepsis	Meninggal	3 hari	Ceftriaxone 350mg/12j	√	√	√							2,6666	2	CVC	Tidak		
						Paracetamol 70mg/8j	√	√	√												
						Furosemid 3mg/12j		√	√												
						Norepineprin 0,5ml/j	X														
						Epineprin 1ml/j		X	X												
						Dopamin 10mcq-2ml/j		X	X												
						Ketamin 10mcq-4ml/j		X	X												

No	Usia / BB	JK	Diagnosa	Satatus keluar	LOS	Nama obat dan Nama Cairan IV	Jumlah Obat dan Cairan / Hari										Rata rata Penggunaan Obat Rawat Inap	Rata rata Penggunaan Obat 1 Waktu	Jalur IV	Kejadian <i>Phlebitis</i> ya/tidak	
							1	2	3	4	5	6	7	8	9	10					
188	8th / 11bln / 18kg	P	Stress ulcer, sepsis, hipokalemia, anemia	Membaik	5 hari	Ceftriaxone 50mg/hr	√	√	√									2,6	2	CVC	Tidak
						Metronidazole 15mg/8j	√														
						Gentamicin 2,5mg/8j	√														
						Ketorolac 20mg/6j	√	√	√												
						Paracetamol 200mg/Kp	√	√	√												
						Ranitidin 25mg/8j		√	√												
						Rf 1ml/j	X														
Fentanil 1mcq-0,2ml/j		X	X																		
189	1th/10kg	L	Anemia, sepsis, asidosis metabolik, hipoalbumin, syndrom nefrotik	Membaik	4 hari	Cefotaxime 200mg/6j	√	√	√	√							4,4	2	CVC	Tidak	
						Omeprazole 5mg/12j	√	√	√	√											
						Furosemid 3mg/12j		√													
						Paracetamol 125mg/Kp				√	√										
						D5 1/2 N5 10ml/j	X	X	X	X											
						Fentanil 1mcq-0,2ml/j			X	X											
190	15th/45kg	P	Stres ulcer, hipokalemia, anemia, sepsis	Membaik	5 hari	Cefotaxime 2g/8j	√	√	√	√							3,2	1	CVC	Tidak	
						Furosemid 10mg/8j	√	√	√	√											
						Paracetamol 500mg/6j		√	√	√											
						Omeprazole 40mg/12j			√												
						Kalium 2g/8j			√	√											
						Natriumcarbonat 300mg/8j			√	√											
						Midazolam 6,7ml/j	X	X	X	X											
						Fentanil 0,9ml/j			X	X											
						Insulin 1,9ml/j		X	X												
NaCl 0,9% 25ml/j		X		X																	

البحر الإسلامي للأندلس

No	Usia / BB	JK	Diagnosa	Satatus keluar	LOS	Nama obat dan Nama Cairan IV	Jumlah Obat dan Cairan / Hari										Rata rata Penggunaan Obat Rawat Inap	Rata rata Penggunaan Obat 1 Waktu	Jalur IV	Kejadian <i>Phlebitis</i> ya/tidak			
							1	2	3	4	5	6	7	8	9	10							
191	2th 2bln/ 15kg	L	<i>Phlebitis</i> , anemia, hipematremia, stress ulcer, sepsis	Membaik	6 hari	Cefotaxime 400mg/8j	√	√	√	√	√	√							5,3333	1	PVC	Ya	
						Metronidazole 15mg/8j	√	√	√	√	√	√											
						Paracetamol 150mg/6j	√	√	√	√	√	√											
						Ranitidin 15mg/12j	√	√	√	√													
						Sukralfat 1g/6j	√	√	√	√													
						Nebu Ventoilin 10ml/8j		√	√	√													
						Furosemid 20mg				√	√												
						Dulcolac supp					√												
						Rf 10ml/j	x	x	x	x	x												
						Midazolam 1mcq-1,8ml/j			x	x	x												
Fentanil 1mcq-2ml/j		x	x																				
192	1th 8bln/ 9kg	P	Anemia, sepsis, gizi kurang, epilepsi, hipertensi std 2	Meninggal	4 hari	Cefotaxime 250mg/8j	√	√	√	√								4,5	2	CVC	Tidak		
						Paracetamol 100mg/6j	√	√	√	√													
						Kalium 2g/8j	√	√															
						Sukralfat 1g/6j		√	√	√													
						Sanbplex 0,6ml/hr			√	√													
						Fenitoin 25mg/8j			√	√													
						Lisinopril 5mg/24j				√													
						D5 1/2 1mcq-10ml/j	x	x	x	x													
						Fentanil 1mcq-0,18ml/j		x	x	x													
Transfusi PRC 12,5ml/j		x																					
D10Na2K1Ca1 1ml/j		x	x	x																			
193	2th/9 kg	L	Epilepsi, upper GIT bleeding, sepsis, rubella, anemia	Membaik	3 hari	Meropenem 700mg/8j	√	√	√								4,6666	1	CVC	Tidak			
						Ketorolac 20mg/6j	√																
						Fenitoin 45mg/12j	√	√	√														
						Prednisolon 2mg/12j	√																
						Paracetamol 200mg/8j	√	√	√														
						Omeprazole 20mg/12j		√															

No	Usia / BB	JK	Diagnosa	Satatus keluar	LOS	Nama obat dan Nama Cairan IV	Jumlah Obat dan Cairan / Hari										Rata rata Penggunaan Obat Rawat Inap	Rata rata Penggunaan Obat 1 Waktu	Jalur IV	Kejadian <i>Phlebitis</i> ya/tidak
							1	2	3	4	5	6	7	8	9	10				
						Sucralfat 250mg/8j			√											
						Furosemid 10mg/8j			√											
						Rf 10ml/j	X	X												
						Fentanil 3mcq-0,84ml/j		X	X											
						Dopamin 10mcq-2ml/j		X	X											
						Dobutamin 10mcq-2ml/j		X												
						Plasbumin 5% -500ml/j		X	X											
						Epineprin 1ml/j														
194	13th/ 35kg	P	Edema cerebri, anemia, sepsis, pneumonia	Membaik	3 hari	Cefotaxime 50mg/8j	√	√	√								5,3333	1	CVC	Tidak
						Fenitoin 5mg/hr	√	√	√											
						Manitol 12cc/j	√	√	√											
						Paracetamol 500mg/6j	√	√	√											
						Kloralhidrat 0,2ml/8j	√													
						Diazepam 10mg/8j	√													
						Ketorolac 20mg/6j		√	√											
						Rf 1ml/j	X	X												
						Midazolam 1mcq-2,1ml/j	X	X	X											
195	6th 3bln/ 11kg	P	Gizi buruk, sepsis, anemia, hipoalbumin, epilepsi, hiperkalsemia	Membaik	10 hari	Cefotaxime 500mg/12j	√	√	√	√							6,4	4	CVC	Tidak
						As.Volat 4cc/12j	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√				
						Clinazepam 0,4cc/12j	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√				
						Piracetam 2g/6j	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√				
						Furosemid 5mg/6j	√													
						Nebu Nacl 9%/8j	√		√	√	√	√	√	√	√	√				

No	Usia / BB	JK	Diagnosa	Satatus keluar	LOS	Nama obat dan Nama Cairan IV	Jumlah Obat dan Cairan / Hari										Rata rata Penggunaan Obat Rawat Inap	Rata rata Penggunaan Obat 1 Waktu	Jalur IV	Kejadian <i>Phlebitis</i> ya/tidak
							1	2	3	4	5	6	7	8	9	10				
						Sanbeplex 0,6ml/hr		√	√	√	√	√	√	√	√	√				
						paracetamol 110mg/Kp				√	√	√	√	√	√					
						Kloralhidrat 3cc/6j					√	√	√	√	√					
						Rf 7ml/j	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X				
						Midazolam 1mcq-0,6ml/j							X	X	X	X				
						Fentanil 0,2ml/j					X	X	X							
						Albumin 2-% 1ml/j				X	X									
196	17th 11bln /50kg	P	Anemia, zygoma, edema, hiperalbumin, sepsis	Membaik	8 hari	Cefotaxime 1g/12j	√	√	√	√	√	√	√	√	√		3,875	1	CVC	Tidak
						Paracetamol 10mg/6j	√	√	√	√	√	√	√	√	√					
						Ranitidin 50mg/12j	√													
						Kalnex 500mg/8j	√	√	√	√										
						Ketorolac 30mg/8j	√	√	√	√	√	√	√	√	√					
						Nebu NaCl 0,9%/8j		√			√									
						Rf 30ml/j	X	X	X	X	X	X	X	X	X					
197	15th/ 44kg	P	Anemia, sepsis, hipertensi std 2, hipoalbumin, CKD std 5	Membaik	4 hari	Cefotaxime 50mg/6j	√	√	√	√							9,5	2	CVC	Tidak
						Metronidazole 500mg/8j	√		√	√										
						Labesartan 300mg/24j	√	√	√	√										
						Bisoprolol 2,5mg/24j	√	√	√	√										
						Furosemid 80mg/8j	√	√	√	√										
						Caco3 500mg/8j	√	√	√	√										
						As.Volat 1mg/8j	√	√	√	√										
						Amlodipin 10mg/24j	√	√	√	√										
						Paracetamol 500mg/6j	√	√												
						MIX 3 10cc/8j	√													
						Dulcolax supp		√	√	√										
						Nifedipin 5mg sublingual			√											

No	Usia / BB	JK	Diagnosa	Statatus keluar	LOS	Nama obat dan Nama Cairan IV	Jumlah Obat dan Cairan / Hari										Rata rata Penggunaan Obat Rawat Inap	Rata rata Penggunaan Obat 1 Waktu	Jalur IV	Kejadian <i>Phlebitis</i> ya/tidak	
							1	2	3	4	5	6	7	8	9	10					
198	1th 2bln/ 9,5kg	P	Anemia, gizi buruk, atelektasis pulmp dextra, sepsis	Membaik	4 hari	D5 1/2 N5 1ml/j	X	X	X	X								4,25	1	CVC	Tidak
						Albumin 25% 5ml/j			X	X											
						Cefotaxime 500mg/12j	√	√	√	√											
						Paracetamol 10mg/Kp	√	√	√	√											
						Kalnex 500mg/8j	√	√													
						Chloralhidrat 5c/8j	√	√													
						Nebu Fluticasone 1g/8j	√	√	√	√											
						Azitromicin 150mg/24j		√	√	√											
						Rf 1ml/j	X	X	X	X											
						Midazolam 1mcq-0,6ml/j			X	X											
Fentanil 2mcq-0,4ml/j		X	X																		
Ketamin 10mcq-2ml/j		X	X	X																	
199	13th/ 54kg	L	Edema cerebri, anemia, sepsis, hipelkalsemia	Membaik	3 hari	Cefotaxime 1g/6j	√	√	√								3,3	2	CVC	Tidak	
						Metronidazole 500mg/8j	√	√	√												
						Paracetamol 500mg/6j	√	√	√												
						Omeprazole 40g/12j	√		√												
						D10% Na2K1Ca1 32ml/j	X	X	X												
						Fentanil 1mcq-1,1ml/j	X	X	X												
200	15th/ 45kg	L	Edema cerebri, anemia, sepsis, GIT bleeding, hipoalbumin, hipernatremia	Membaik	10 hari	Ceftriaxone 1g/12j	√	√	√	√	√						8,8	2	CVC	Tidak	
						Ranitidin 50mg/8jj	√	√													
						Ketorolac 30mg/8j	√	√													
						As.Tranexamat 500mg/8j	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√					
						Citicoline 500mg/12j	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√					
						Amlodipin 10mg/24j	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√					

No	Usia / BB	JK	Diagnosa	Satatus keluar	LOS	Nama obat dan Nama Cairan IV	Jumlah Obat dan Cairan / Hari										Rata rata Penggunaan Obat Rawat Inap	Rata rata Penggunaan Obat 1 Waktu	Jalur IV	Kejadian <i>Phlebitis</i> ya/tidak
							1	2	3	4	5	6	7	8	9	10				
						Bisoprolol 2,5mg/24j	√	√	√	√	√	√								
						Paracetamol 500mg/6j	√	√	√	√	√	√	√	√	√					
						Sucralfat 1g/6j	√	√	√	√	√	√	√							
						Metilprednisolon 500mg/8j	√													
						Nebu Adrenalin 0,01mg/2mnt	√													
						Omeprazole 40mg/12j			√	√	√	√	√	√						
						Cefotaxime 500mg/6j					√	√	√	√	√					
						Ampicillin 50g/6j								√	√					
						Chloralhidrat -.3cc/54j								√	√					
						Midazolam 2mcq-8,1ml/j	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X				
						D10% Na2K1Ca1 32ml/j	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X				
						Morphin 10mcq-2ml/j	X	X	X		X	X				X				
						Albumin 25% 5ml/j			X	X			X	X	X					

Keterangan :
 √ : Jumlah Obat/hari
 X : Jumlah Cairan/hari

Lampiran 3 Hasil pengolahan data menggunakan SPSS versi 15.0

Analisis Bivariat

Obat vesicant * Phlebitis

Crosstab

		<i>Phlebitis</i>		Total	
		Tidak <i>Phlebitis</i>	<i>Phlebitis</i>		
Obat vesicant	Tidak vesicant	Count	60	1	61
		% of Total	30%	0,5%	30,5%
vesicant		Count	123	16	139
		% of Total	61,5%	8%	69,5%
Total		Count	183	17	200
		% of Total	91,5%	8,5%	100,0%

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymp. Sig. (2-sided)	Exact Sig. (2- sided)	Exact Sig. (1- sided)
Pearson Chi-Square	5.272 ^a	1	.022	.031	.018
Continuity Correction ^b	4.481	1	.034		
Likelihood Ratio	5.202	1	.023		
Fisher's Exact Test					
Linear-by-Linear Association	5.246	1	.022		
N of Valid Cases	200				

a. 0 cells (0.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 16.60.

b. Computed only for a 2x2 table

Symmetric Measures

	Value	Approx. Sig.
Nominal by Nominal Contingency Coefficient	.160	.022
N of Valid Cases	200	

Jumlah obat * Phlebitis**Crosstab**

		<i>Phlebitis</i>		Total	
		Tidak <i>Phlebitis</i>	<i>Phlebitis</i>		
Jumlah obat	2	Count	13	1	14
		% of Total	6,5%	0,5%	7%
	3	Count	31	1	16
		% of Total	15,5%	0,5%	8%
	4	Count	24	1	25
		% of Total	12,0%	0,5%	12,5%
	5	Count	18	1	19
		% of Total	9,0%	0,5%	9,5%
	6	Count	18	2	20
		% of Total	9,0%	1,0%	10%
	7	Count	18	1	19
		% of Total	9,0%	0,5%	9,5%
	8	Count	27	1	28
		% of Total	13,5%	0,5%	14,0%
	9	Count	17	2	19
		% of Total	8,5%	1,0%	9,5%
	10	Count	4	1	5
		% of Total	2,0%	1,0%	2,5%
	11	Count	4	2	6
		% of Total	2,0%	1,0%	3,0%
	12	Count	4	1	5
		% of Total	2,0%	0,5%	2,5%
	13	Count	2	1	3
		% of Total	1,0%	0,5%	1,5%
	14	Count	2	1	3
		% of Total	1,0%	0,5%	1,5%
	15	Count	1	1	2
		% of Total	0,5%	0,5%	1,0%
	Total	Count	183	17	200
		% of Total	91,5%	8,5%	100,0%

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymp. Sig. (2-sided)
Pearson Chi-Square	15.766 ^a	1	.000
Likelihood Ratio	14.316	1	.000
Linear-by-Linear Association	15.832	1	.000
N of Valid Cases	200		

a. 0 cells (0,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is .20.

Symmetric Measures

	Value	Approx. Sig.
Nominal by Nominal Contingency Coefficient	.281	.000
N of Valid Cases	200	

Potensial Inkompabilitas * Phlebitis**Crosstab**

		<i>Phlebitis</i>		Total	
		Tidak <i>Phlebitis</i>	<i>Phlebitis</i>		
Potensial Inkompabilitas	Tidak Inkompabilitas	Count	71	1	72
		% of Total	35,5%	0,5%	36%
	Inkompabilitas	Count	112	16	128
		% of Total	56%	8,5%	91,5%
Total		Count	183	17	200
		% of Total	91,5%	8,5%	100.0%

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymp. Sig. (2-sided)	Exact Sig. (2- sided)	Exact Sig. (1- sided)
Pearson Chi-Square	15.761 ^a	1	.000		
Continuity Correction ^b	14.310	1	.000		
Likelihood Ratio	14.981	1	.000		
Fisher's Exact Test				.000	.000
Linear-by-Linear Association	15.683	1	.000		
N of Valid Cases	200				

- a. 0 cells (0.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 13.40.
 b. Computed only for a 2x2 table

Symmetric Measures

	Value	Approx. Sig.
Nominal by Nominal Contingency Coefficient	.270	.000
N of Valid Cases	200	

